

Термінове повідомлення №9 про появу та розвиток шкідників і хвороб
сільськогосподарських культур

ШКІДНИКИ ТА ХВОРОБИ СОНЯШНИКУ

Спостерігається інтенсивне розселення та розмноження *геліхризової попелиці* в посівах соняшнику. Шкідником заселено 4,5-8,0% рослин, при середній чисельності 5,0 екз/рослину.

При утриманні вологої та теплої погоди розмноження фітофага триватиме, щільність заселення рослин зросте.

Рекомендується проводити постійний моніторинг посівів соняшнику і перед цвітінням при заселенні попелицями понад 20% рослин і наявності 40-50 екз/рослину, необхідно провести обприскування одним з інсектицидів, згідно «Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні» (зі змінами та доповненнями).

В посівах соняшнику спостерігається поширення та розвиток *пероноспорозу*, яким уражено 1,6-3,0% рослин на 9% обстежених площ.

В першій декаді липня розвиток та поширення хвороби триватиме, ураженість рослин зросте.

Рекомендується провести обстеження посівів соняшнику і при виявленні ураження рослин пероноспорозом, необхідно провести фунгіцидну обробку одним з препаратів, згідно «Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні» (зі змінами та доповненнями).

Увага!!! При роботі з пестицидами необхідно суворо дотримуватись правил техніки безпеки та санітарно-гігієнічних вимог.