

Термінове повідомлення №3 про появу та розвиток шкідників і хвороб сільськогосподарських культур

ШКІДНИКИ ТА ХВОРОБИ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ

Триває заселення та живлення на сходях цукрових буряків жуків *сірого бурякового довгоносика*, *бурякової крихітки* та *бурякових блішок*. Шкідниками пошкоджено 0,3-2,0% рослин, при чисельності довгоносика - 0,2 екз/кв.м, крихітки – 0,5 екз/кв.м та блішок – 0,4 екз/кв.м.

За умов теплої та сухої погоди живлення фітофагів триватиме, пошкодженість рослин зросте.

Рекомендується проводити постійний моніторинг посівів ц/буряків і при перевищенні ЕПШ: сірого бурякового довгоносика 0,3-0,5 екз/кв.м., бурякових блішок 3,0-7,0 екз/кв.м. або інших шкідників, провести захист посівів застосувавши препарати, згідно «Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні» (зі змінами та доповненнями).

Швидке висушування ґрунту в післясходовий період на посівах цукрових буряків, призвело до ураження 1,0% рослин *коренеїдом* на 10% обстежених площ.

Наявність ґрунтової кірки сприятиме зростанню кількості уражених коренеїдом рослин.

Рекомендується для покращення аерації ґрунту в післясходовий період, а також для оздоровлення рослин та знищення бур'янів, провести розпушування міжрядь у посівах цукрових буряків.

Увага!!! При роботі з пестицидами необхідно суворо дотримуватись правил техніки безпеки та санітарно-гігієнічних вимог.