

Термінове повідомлення №4 про появу та розвиток шкідників і хвороб сільськогосподарських культур

ШКІДНИКИ ТА ХВОРОБИ ЯРИХ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР

Спостерігається активне живлення імаго *злакових п'явиць* та *хлібної смугастої блішки* в посівах ярих зернових культур. Заселених та пошкоджених п'явицями нараховується 1,0% рослин, при чисельності 0,4 екз/кв.м., а блішками – 0,9% рослин, за чисельності 0,3-1,0 екз/кв.м.

Відмічено заселення ярого ячменю *злаковими попелицями*. Фітофагом заселено 0,9-2,0% рослин, при середній чисельності личинок 0,6 екз/рослину.

Спостерігається ураження ярого ячменю *гельмінтоспоріозом*, хвороба поширена на 14% обстежених площ, уражених нараховується 0,7-2,0% рослин. Відмічено прояв та ураження рослин *ринхоспоріозом*. Хвороба виявлена на 8% обстежених площ ярого ячменю, уражено 0,4-1,0% рослин.

В окремих посівах ярих зернових культур спостерігається ураження рослин *кореневими гнилями*. Хвороба поширена на 8% площ, уражено 0,5-2,0% рослин ярини.

Рекомендується задля оздоровлення рослин та запобігання масовому поширенню хвороб на посівах ярих зернових, провести захисні обприскування застосувавши один з фунгіцидів, згідно «Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні» (зі змінами та доповненнями).

Увага!!! При роботі з пестицидами необхідно суворо дотримуватись правил техніки безпеки та санітарно-гігієнічних вимог.