

Термінове повідомлення №5 про появу та розвиток шкідників і хвороб сільськогосподарських культур

СІРИЙ БУРЯКОВИЙ ДОВГОНОСИК

Спостерігається тенденція до зростання чисельності і шкідливості *сірого бурякового довгоносика* у окремих осередках посівів цукрових буряків та соняшнику. Фітофагом пошкоджено 1% рослин ц/буряків, при чисельності 0,2 екз/кв.м., а також 2% рослин соняшнику, за чисельності 0,3 екз/кв.м.

За умов сухої та жаркої погоди жуки довгоносиків заселятимуть посіви вищезазначених культур, живлення шкідника проходитиме активніше, кількість пошкоджених рослин зросте.

Рекомендується, систематично проводити обстеження посівів ц/буряків та соняшнику і при виявленні перевищення ЕПШ сірого бурякового довгоносика (ц/буряк – 0,3-0,5 екз/кв.м., а соняшнику 2,0 екз/кв.м.) негайно провести обприскування, застосувавши один з інсектицидів, згідно «Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні» (зі змінами та доповненнями).

На посівах соняшнику особливу увагу слід звернути на знищення берізки, осоту та інших бур'янів, які є кормом для жуків, а пізніше і личинок бурякового довгоносика.

Увага!!! При роботі з пестицидами необхідно суворо дотримуватись правил техніки безпеки та санітарно-гігієнічних вимог.