

Термінове повідомлення №12 про появу та розвиток шкідників і хвороб
сільськогосподарських культур

ШКІДНИКИ ТА ХВОРОБИ КУКУРУДЗИ

В посівах кукурудзи/зерно спостерігається літ та відкладання яєць *кукурудзяним стебловим метеликом*. Інтенсивність льоту метеликів складає 1,0-2,0 екз/10 хв. в полі зору. Яйцекладками заселено 14% обстеженої площі, при середній чисельності 1,0 кладка/рослину.

В третій декаді липня передбачається зростання інтенсивності льоту та відкладання яєць кукурудзяним стебловим метеликом.

Рекомендується постійно моніторити посіви кукурудзи і при виявленні стеблового метелика, застосувати біологічний метод боротьби: провести випуск трихограми вогнівочної форми (50-100 тис. самиць/га): перший раз – на початку відкладання яєць, другий раз - в період масового відкладання яєць.

Спостерігається розселення та розмноження *злакових попелиць* в посівах кукурудзи. Шкідника виявлено на 43% площ культури, заселених нараховується 4,8-12% рослин, при чисельності личинок 5,0 екз/рослину.

За умов теплої, з помірними опадами погоди, чисельність та шкідливість попелиць в посівах кукурудзи зростає.

Рекомендується для регулювання чисельності попелиць застосувати препарати згідно «Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні» (зі змінами та доповненнями).

Відмічено прояв та розвиток *гельмінтоспоріозу* на листках кукурудзи. Хворобою охоплено 23% обстежених площ, уражених виявлено 1,4-4,0% рослин.

Розвиток та поширення хвороби триватиме, ураження рослин збільшаться.

Рекомендується для запобігання поширення гельмінтоспоріозу провести обприскування посівів кукурудзи одним з фунгіцидів, згідно «Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні» (зі змінами та доповненнями).

Увага!!! При роботі з пестицидами необхідно суворо дотримуватись правил техніки безпеки та санітарно-гігієнічних вимог.

