

03.04.2025

Оперативна інформація

про стан розвитку та розповсюдження основних шкідників і хвороб
сільськогосподарських рослин у Тернопільській області

Звітний тиждень на території Тернопільської області характеризувався прохолодною погодою, наприкінці тижня спостерігалось опади у вигляді дощу та незначне зниження температури.

Максимальна температура повітря вдень підвищувалася до +6...+10°C.

Мінімальна температура повітря вночі знижувалася до +2...+3°C.

Агрометеорологічні умови третьої декади березня в цілому були сприятливими для приживлення та активізації росту і розвитку озимих культур.

В кінці декади погодні умови дозволяли проводити весняну посівну кампанію. Тривала сівба ярого ячменю, вівсу та ріпаку, а також гороху та гірчиці. Підживлено усі площі з озимими зерновими.

Фенологія с/г культур

Озима пшениця – кушення;

Озимий ячмінь – кушення;

Ярі зернові – посів;

Горох – посів;

Озимий ріпак – ріст листків, стеблування;

Багаторічні трави - відростання;

Яблуня – набухання бруньок.

Фітосанітарний стан агроценозів

Фітосанітарним моніторингом посівів озимої пшениці (пл. 0,4 тис.га), озимого ріпаку (пл. 0,3 тис.га) та багаторічних трав (пл. 0,04 тис.га) виявлено, що чисельність **мишоподібних гризунів** становить:

- в посівах озимих зернових культур заселено 65% посівів, при середній чисельності 1,5 жилих колоній/га, максимальній 3,0 жилих колоній/га (2,0-4,0 жилих нір/колонію);
- в посівах озимого ріпаку заселено 73% посівів, при середній чисельності 1,8 жилих колоній/га, максимальній – 3,0 жилих колоній/га (3,0-4,0 жилих нір/колонію);
- в посівах багаторічних трав заселено 44% посівів, при середній чисельності 2,9 жилих колоній/га, максимальній – 5,0 жилих колоній/га (3,0-5,0 жилих нір/колонію);

В другій декаді квітня, при сухій погоді, буде проходити заселення гризунами посівів озимих зернових, озимого ріпаку та багаторічних трав, проходитиме їх живлення сходами рослин, шкідливість зростатиме.

В посівах озимої пшениці (пл. 0,3 тис.га) **хлібною смугастою блішкою** заселено 3% площі, середня чисельність жуків 0,2 екз/кв.м., максимальна 1,0 екз/кв.м, пошкодженість рослин становить 0,2% в слабкому ступені. **Хлібна жужेलія** заселила 2% площі, середня чисельність личинок становить 0,2 екз/кв.м, максимальна 1,0 екз.кв.м., пошкодженість рослин становить 0,3% в слабкому ступені.

Проходить перезараження зимуючих стадій хвороб озимої пшениці та відновлення їх розвитку.

Септоріозом уражено 0,3-2,2% рослин на 10% площі, **борошнистою росю** уражено 0,5-0,6% рослин на 10% площі. **Кореневими гнилями** уражено 0,7-2,0% рослин на 2% площі.

В посівах озимого ріпаку (пл. 0,3 тис.га) **стебловий ріпаковий прихованохоботник** пошкодив 0,3% рослин на 12% площі, середня чисельність складає 0,2-1,0 екз/рослину.

Пероноспорозом уражено 0,2-0,6% рослин на 15% площі, розвиток хвороби становить 0,2%.

В посівах багаторічних трав (пл. 0,02 тис.га) **бульбочковий довгоносик** пошкодив 0,3% рослин на 19% площі, середня чисельність жуків становить 0,2 -1,0 екз/кв.м..

Бульбовий аналіз картоплі

Проведено аналіз бульб картоплі в дрібних селянських господарствах, вага партії 50 центнерів, для аналізу взято 500 клубнів картоплі, виявлено:

Сорт	Кількість шт.	Парша звичайна	Ризоктоніоз	Мокра бактеріальна гниль	Суха бактеріальна гниль	Фітофтороз	Чорна ніжка
Беллароза	500	11	9	2	2	7	1
	100%	2,2%	1,8%	0,4%	0,4%	1,4%	0,1%