

10.04.2025

Інформаційне повідомлення

про стан розвитку та розповсюдження основних шкідників і хвороб
сільськогосподарських рослин у Тернопільській області

Впродовж звітного тижня на території Тернопільської області спостерігалася прохолодна погода, в окремі дні були опади у вигляді снігу з дощем, наприкінці тижня температура повітря дещо підвищилася.

Максимальна температура повітря вдень підвищувалася до +2...+6°C.

Мінімальна температура повітря вночі знижувалася до -4...-1°C.

Фенологія с/г культур

Озимі зернові – кущення;

Ярі зернові – посів, проростання;

Горох – проростання;

Озимий ріпак – вегетація;

Багаторічні трави – відростання;

Сад – висування бутонів.

Фітосанітарний стан агроценозів

Фітосанітарним моніторингом посівів озимої пшениці (пл. 0,1 тис.га) та озимого ріпаку (пл. 0,1 тис.га) виявлено, що чисельність ***мишоподібних гризунів*** становить:

- в посівах озимої пшениці заселено 10% площ, при середній чисельності 1,0 жилих колоній/га, максимально – 1,5 жилих колоній/га (1,0-2,0 жилих нори/колонію);
- в посівах озимого ріпаку заселено 17% обстежених площ, при середній чисельності 1,0 жилих колоній/га, максимально – 2,0 жилих колоній/га (2,0-3,0 жилих нори/колонію);

Інформація
щодо поширення і чисельності шкідників сільськогосподарських рослин в Тернопільській області
станом на 10 квітня 2025 року

№ п/п	Назва культури	Обстежено, тис.га	Назва шкідника	Заселено, %		Чисельність, екз.						Пошкоджено (сисними-заселено) рослин, бруньок, листків, суцвіть, плодів, %		Ступінь пошкодження, %		
				Площ	Рослин (дерев)	Одиниця виміру	Імаго	Яйце	Личинки		Ентомофаги	Середній	Максимальний	Слабкий	Середній	Сильний
									Екз.	вік						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Озима пшениця	0,8	Хлібна жужелиця	3	-	Екз/кв.м			0,2			0,3	1,0	100	0	0
2.			Хлібна смугаста білшкка	3	-	Екз/кв.м			0,2			0,4	1,0	100	0	0
3.			Травневий хрущ	15	-	Екз/кв.м			0,3			0,3	1,0	100	0	0
4.			Дротяники	10		Екз/кв.м			0,5			0,4	1,0	100	0	0
5.	Озимий ріпак	0,8	Стебловий ріпаковий прихованохоботник	5	0,4	Екз/рослину			0,2			0,4	2,0	100	0	0
6.	Конюшина	0,04	Бульбочкові довгоносики	11	-	Екз/кв.м	0,2					0,4	1,0	100	0	0
7.			Конюшинний насіннєд-апіон	6		Екз/кв.м	0,2					0,4	2,0	100	0	0
8.	Яблуня	0,02	Яблуневий квіткоїд	18	2,7	Екз/дерево	1,0					0,3	1,0	100	0	0

Інформація
щодо ураження хворобами сільськогосподарських рослин в Тернопільській області
станом на **10 квітня 2025 року**

№ п/п	Назва культури	Обстежено, тис.га	Назва хвороби	У Р А Ж Е Н О, %						Розвиток хвороби, %	Загинуло рослин, %
				Площ	Рослин		Назва ураженого органу	Органів рослин			
					Середній	Максимальний		середній	максимальн.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Озима пшениця	0,8	Борошниста роса	4	0,7	2,0	листя	0,4	1,0	0,3	-
2.			Септоріоз	3	0,4	1,0	листя	0,3	1,0	0,3	-
3.			Кореневі гнилі	3	0,8	2,0	корінь	0,8	2,0	-	-
4.	Озимий ріпак	0,8	Пероноспороз	5	0,7	2,0	листя	0,5	2,0	0,5	-