

17.04.2025

Оперативна інформація

про стан розвитку та розповсюдження основних шкідників і хвороб
сільськогосподарських рослин у Тернопільській області

Впродовж звітного тижня на території Тернопільської області спостерігалась різка зміна погодних умов. На початку, з проходженням холодних атмосферних фронтів відбулось зниження температурних показників до від'ємних та зміна фази опадів з дощу на сніг. У ранкові години спостерігався незначний сніговий покрив та слабе промерзання ґрунту. Такі погодні умови були небезпечними для плодівих дерев, заморозки могли пошкодити бруньки та цвіт, що розпустилися.

В другій половині спостерігалось різке підвищення температури та тепла сонячна погода. Господарства відновили посівну.

Максимальна температура повітря вдень підвищувалася до +6...+20°C.

Мінімальна температура повітря в найхолодніші ночі знижувалася до -4...-1°C.

Фенологія с/г культур

Озимі зернові – кущення;
Ярі зернові – проростання;
Горох – проростання;
Картопля – посадка;

Озимий ріпак – вегетація;
Багаторічні трави – відростання;
Сад – зелений конус.

Фітосанітарний стан агроценозів

В посівах озимої пшениці (пл. 0,9 тис.га) **злаковою п'явицею** пошкоджено 0,2-1,0% рослин на 3% обстежуваної площі, середня чисельність становить 0,5 екз/кв.м., **дротяниками** пошкоджено 0,4-1,0% рослин на 2% обстежуваної площі, середня чисельність становить 0,5 екз/кв.м., **хлібною жужелицею** пошкоджено 0,5-2,0% рослин на 3% площі, чисельність 0,2 екз/кв.м.. **Хлібною смугастою блішкою** пошкоджено 0,6-2,0% рослин на 8% площі, середня чисельність становить 0,3 екз/кв.м..

Септоріозом уражено 0,6-2,0% рослин на 7% площі, **борошнистою россою** уражено 1,1-3,0% рослин на 3% площі, пероноспорозом уражено 1,0-3,0% рослин на 7% площі та **кореневими гнилями** уражено 0,6-2,0% рослин на 4% площі.

В посівах озимого ріпаку (пл. 1,0 тис.га) спостерігається пошкодження 0,9-2,0% рослин **стебловим ріпаковим прихованохоботником** на 8% площі, чисельність становить 0,6 екз/рослину. **Ріпаковим квіткоїдом** заселено 2,2% рослин на 2% площі, чисельність становить 1,0 екз/рослину. **Насіннєвим прихованохоботником** пошкоджено 2,5-4,0% рослин також на 2% площі, середня чисельність 1,0 екз/рослину.

Пероноспорозом уражено 1,0-3,0% рослин на 6% площі.

В посівах багаторічних трав (пл. 0,04 тис.га) спостерігається пошкодження 0,7-2,0% рослин **бульбочковим довгоноси́ком** на 16% площі, чисельність 0,3 екз/кв.м., та **конюшинним насіннєїдом** пошкоджено 0,4-1,0% рослин на 8% площі, чисельність становить 0,2 екз/кв.м..

В саду (пл. 0,03 тис.га) спостерігається пошкодження 0,4-1,0% рослин **яблуневим квіткоїдом** на 15% площі, чисельність становить 1,0 екз/дерево.

Фітосанітарним моніторингом посівів озимої пшениці (пл. 0,2 тис.га) та озимого ріпаку (пл. 0,2 тис.га) виявлено, що чисельність **мишоподібних гризунів** в посівах озимого ріпаку становить 2,0 жилих колоній/га, максимально 3,0 жилих колоній/га (1,0-2,0 жилих нори/колонію).

В посівах озимої пшениці спостерігаються поодинокі нори мишоподібних.