

24.04.2025

Інформаційне повідомлення

про стан розвитку та розповсюдження основних шкідників і хвороб
сільськогосподарських рослин у Тернопільській області

Звітний тиждень на території Тернопільської області характеризувався досить теплою погодою, було сонячно та сухо.

Максимальна температура повітря вдень підвищувалася до +20...+23°C.

Мінімальна температура повітря вночі знижувалася до +2...+12°C.

Завдяки підвищеному температурному режиму та достатній кількості опадів утворилися сприятливі умови для появи сходів та початкового росту ранніх зернових культур, а також активній вегетації озимини. На прикінці другої декади квітня масово зацвіли вишні та черешні, що на 10 днів раніше середніх багаторічних строків.

Фенологія с/г культур

Озимі зернові – початок трубкування;

Ярі зернові – три листки, початок
кущення;

Кукурудза – посів;

Горох – три листки;

Цукровий буряк – проростання;

Соняшник – посів;

Озимий ріпак – початок цвітіння;

Картопля – проростання;

Багаторічні трави – стеблування;

Сад – початок цвітіння.

Фітосанітарний стан агроценозів

В посівах озимої пшениці спостерігається пошкодження личинками **травневого хруща** 0,4% рослин в слабкому ступені, при чисельності 0,3-1,0 екз/кв.м.

Личинки **дротяників** пошкодили 1,8% рослин озимої пшениці в слабкому ступені, при чисельності 0,6-1,0 екз/кв.м.

Кореневими гнилями уражено 0,2-1,0% посівів гороху на 8% обстеженої площі.

Інформація
щодо поширення і чисельності шкідників сільськогосподарських рослин в Тернопільській області
станом на 24 квітня 2025 року

№ п/п	Назва культури	Обстежено, тис.га	Назва шкідника	Заселено, %		Чисельність, екз.						Пошкоджено (сисними-заселено) рослин, бруньок, листків, суцвіть, плодів, %		Ступінь пошкодження, %		
				Площ	Рослин (дерев)	Одиниця виміру	Іма-го	Яй-це	Личинки		Енто-мо-фаги	Серед-ній	Макси-маль-ний	Слаб-кий	Сере-дній	Силь-ний
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Озима пшениця	0,8	Хлібна смугаста блішка	60	-	Екз/ кв.м	2,3					4,1	8,0	100	0	0
2			Злакові п'явиці	13	-	Екз/ кв.м	0,3					0,5	2,0	100	0	0
3			Злакові попелиці	20	0,9	Екз/ рослину			0,4			0,9	2,0	100	0	0
4	Ярий ячмінь	0,05	Хлібна смугаста блішка	100	-	Екз/ кв.м	0,3					0,5	2,0	100	0	0
5			Злакові мухи	21	0,4	Екз/ рослину			0,3			0,4	2,0	100	0	0
6			Злакові попелиці	16	0,4	Екз/ рослину			0,2			0,4	1,0	100	0	0
7			Злакові п'явиці	10	-	Екз/ кв.м	0,2					0,3	1,0	100	0	0
8	Горох	0,03	Бульбочкові довгоносики	100	-	Екз/ кв.м	0,4					1,2	3,0	100	0	0
9	Озимий ріпак	0,75	Ріпаковий квіткоїд	80	4,6	Екз/ рослину	2,1					4,6	11,0	100	0	0
10			Стебловий ріпаковий прихованохоботник	26	1,8	Екз/ рослину	1,1					1,8	4,0	100	0	0

11			Ріпаковий Насіннєвий прихованохоботник	9	0,6	Екз/ рослину	0,4					0,6	3,0	100	0	0
12	Капуста	0,001	Хрестоцвіті блішки	100	-	Екз/ кв.м	0,4					0,9	2,0	100	0	0
13	Яблуня	0,03	Яблуневий квіткоїд	100	27	Екз/ дерево	2,0					2,8	5,0	100	0	0
14			Зелена яблунева попелиця	35	4,3	Екз/п.м. гілки			1,0			4,3	7,0	100	0	0
15			Червоний плодовий кліщ	12	1,9	Екз/п.м. гілки			1,0			0,3	1,0	100	0	0

Інформація
щодо ураження хворобами сільськогосподарських рослин в Тернопільській області
станом на **24 квітня 2025 року**

№ п/п	Назва культури	Обстежено, тис.га	Назва хвороби	У Р А Ж Е Н О, %						Розвиток хвороби, %	Загинуло рослин, %
				Площ	Рослин		Назва ураженого органу	Органів рослин			
					Середній	Максимальний		середній	максимальн.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Озима пшениця	0,8	Борошниста роса	20	1,4	3,0	листя	1,4	3,0	0,8	-
2			Септоріоз	12	0,8	2,0	листя	0,8	2,0	0,5	-
3			Піренофороз	2	0,3	1,0	листя	0,3	1,0	0,3	-
4			Кореневі гнилі	8	0,9	3,0	корінь	0,9	3,0	-	-
5	Ярий ячмінь	0,05	Кореневі гнилі	6	0,3	1,0	корінь	0,3	1,0	-	-
6	Озимий ріпак	0,75	Пероноспороз	21	1,4	3,0	листя	1,4	3,0	0,8	-
7			Циліндроспоріоз	9	0,4	1,0	листя	0,4	1,0	0,3	-