

01.05.2025

Оперативна інформація щодо фітосанітарного стану агроценозів у Тернопільській області

Звітний тиждень на території Тернопільської області характеризувався помірно теплою погодою. В останні дні звітного періоду вночі спостерігалися заморозки, що призвели до пошкодження плодових культур.

Максимальна температура повітря вдень підвищувалася до +19...+22°C.

Мінімальна температура повітря в найхолодніші ночі знижувалася до -1°C, в решта ночей становила +5...+8°C

Фенологія с/г культур

Озимі зернові – трубкування;
Ярі зернові – кущення;
Кукурудза – проростання;
Горох – три листки;
Цукровий буряк – проростання;
Соняшник – проростання-сходи;

Озимий ріпак – цвітіння;
Картопля – проростання;
Багаторічні трави – стеблування;
Сад – цвітіння.

Фітосанітарний стан агроценозів

В посівах озимої пшениці (пл. 0,4 тис.га) **злаковою п'явицею** заселено 0,7% рослин на 16% обстежуваної площі, середня чисельність становить 0,3 екз/кв.м. **Злакові попелиці** заселили 1,1% рослин на 18% обстежуваної площі, середня чисельність становить 0,4 екз/рослину. **Хлібною смугастою блішкою** пошкоджено 4,8% рослин в слабкому ступені на 58% площі, середня чисельність становить 2,7-4,0 екз/кв.м.

Септоріозом уражено 1,2-3,0% рослин на 8% площі, **борошнистою россою** уражено 1,7-4,0% рослин на 12% площі, **піренофорозом** уражено 0,3-1,0% рослин на 3% площі та **кореневими гнилями** уражено 1,0-3,0% рослин на 5% площі.

В посівах ярого ячменю (пл. 0,14 тис.га) спостерігається заселення 0,5% рослин **злаковими мухами** на 23% обстеженої площі, середня чисельність 0,3 екз/рослину. **Злаковою п'явицею** заселено 0,4% рослин на 14% обстежуваної площі, середня чисельність становить 0,2 екз/кв.м. **Злакові попелиці** заселили 0,6% рослин на 18% обстежуваної площі, середня чисельність становить 0,3 екз/рослину. **Хлібною смугастою блішкою** пошкоджено 0,9% рослин в слабкому ступені на 100% обстеженої площі, чисельність становить 0,3-1,0 екз/кв.м.

Спостерігається ураження 0,5-2,0% рослин ярого ячменю **гельмінтоспоріозом** на 8% обстеженої площі. **Кореневі гнилі** уразили 0,4-1,0% рослин на 6% посівів ячменю.

В посівах гороху (пл. 0,05 тис.га) **бульбочкових довгоносиків** виявлено на 65% площі, пошкоджено 2,6% рослин при чисельності 0,8-2,0 екз/кв.м. **Горохова попелиця** заселила 0,9% рослин на 6% обстеженої площі, при чисельності 7,0-12,0 екз/100 помахів сачком.

Кореневі гнилі уразили 0,2-1,0% рослин на 4% посівів гороху.

В посівах соняшнику (пл. 0,13 тис.га) **сірих бурякових довгоносиків** виявлено на 13% площі, пошкоджено 0,3% рослин при чисельності 0,2-1,0 екз/кв.м. **Піщаним мідляком** пошкоджено 0,2% рослин на 8% обстеженої площі, при чисельності 0,2-1,0 екз/кв.м.

В яблуневому саду (пл. 0,03 тис.га) спостерігається пошкодження 3,2% бутонів на 42% дерев **яблуневим квіткоїдом**, чисельність становить 3,0-5,0 екз/дерево. **Зелена яблунева попелиця** заселила 5,3% дерев яблуні на 47% саду, при чисельності 2,0-4,0 екз/п.м. гілки. **Розанова листокрутка** пошкодила 1,6% дерев на 6% площ яблуневого саду, чисельність 0,3-1,0 екз/100 листових розеток. **Червоними плодовими кліщами** заселено 2,8% дерев яблуні на 12% обстежених площ, чисельність 1,0-2,0 екз/п.м. гілки.

Виявлено ураження 0,6-2,0% дерев та 0,3-1,0% листків яблуні **борошнистою росю** на 12% обстежених площ.