

03.07.2025

Інформаційне повідомлення

щодо фітосанітарного стану агроценозів у Тернопільській області

Впродовж звітного тижня на території Тернопільської області була тепла погода, в окремі дні були невеликі опади, у вигляді дощу, наприкінці тижня спостерігалось підвищення температури повітря.

Максимальна температура повітря вдень підвищувалася до +21...+29°C.

Мінімальна температура повітря вночі знижувалася до +14...+16°C.

Фенологія с/г культур

Озимі зернові – молочна молочно -
воскова стиглість;
Ярі зернові – цвітіння, молочна
стиглість;
Кукурудза – 11- листків;
Горох – початок утворення бобів, II етап
дозрівання;
Соя – бутонізація початок цвітіння;
Соняшник – поява суцвіть;

Цукровий буряк – змикання рядків;
Озимий ріпак – формування насіння,
дозрівання;
Картопля – цвітіння;
Капуста – формування качана;
Багаторічні трави – відростання;
Сад – ріст плодів.

Фітосанітарний стан агроценозів

В посівах цукрових буряків відмічено заселення **травневим хрущем** 51% обстеженої площі, середня чисельність личинок складає 0,3 екз/кв.м., максимальна 1,0 екз/кв.м., пошкодженість рослин становить 0,6-2,0% в слабкому ступені.

Дротяниками заселено 67% обстежуваної площі цукрових буряків. середня чисельність личинок складає 0,4 екз/кв.м., максимальна 1,0 екз/кв.м., пошкодженість рослин становить 1,2-3,0% в слабкому ступені.

Озимою совкою заселено 14% обстежуваної площі. Проходить живлення гусениць II-III віків. Середня чисельність личинок складає 0,3 екз/кв.м., максимальна 1,0 екз/кв.м., пошкодженість рослин становить 0,7% в слабкому ступені.

В першій декаді липня в умовах теплої та вологої погоди буде продовжуватися живлення личинок травневого хруща, дротяника та живлення гусениць і заляльковування озимої совки.

Інформація
щодо поширення і чисельності шкідників сільськогосподарських рослин в Тернопільській області
станом на 03 липня 2025 року

№ п/п	Назва культури	Обсте жено, тис.га	Назва шкідника	Заселено, %		Чисельність, екз.						Пошкоджено (сисними- заселено) рослин, бруньок, листків, суцвіть, плодів, %		Ступінь пошкодження, %		
				Площ	Рослин (дерев)	Одиниця виміру	Іма- го	Яй- це	Личинки		Енто- мо- фаги	Серед- ній	Макси- маль- ний	Слаб- кий	Сере- дній	Силь- ний
									Екз.	вік						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Озима пшениця	0,6	Злакові попелиці	57	4,1	Екз/ колос			3,1		1,0	4,1	9,0	100	0	0
2			Пшеничний трипс	19	2,9	Екз/ колос			3,0			2,9	6,0	100	0	0
3			Хлібний жук	5	0,4	Екз/ колос	0,2					0,4	2,0	100	0	0
4			Хлібний клоп елія гостроголова	3	0,3	Екз/ колос	0,2		0,2			0,3	1,0	100	0	0
5	Ярий ячмінь	0,2	Злакові попелиці	7	0,7	Екз/ рослину			1,0			0,7	2,0	100	0	0
6	Горох	0,05	Горохова галиця	17	0,5	Екз/ рослину			2,0			0,5	1,0	100	0	0
7			Горохова зернівка	35	1,6	Екз/ рослину			1,0			1,6	2,0	100	0	0
8			Горохова плодожерка	22	0,9	Екз/ рослину			1,0			0,9	1,0	100	0	0
9	Соя	0,5	Соєва попелиця	50	2,4	Екз/ рослину			2,0		1,0	2,4	5,0	100	0	0
10			Совка гамма	3	0,4	Екз/ 100 п.с.			0,2			0,4	1,0	100	0	0

11	Кукурудза	0,4	Злакові попелиці	30	4,8	Екз/ рослину			4,0		1,0	4,8	10,0	100	0	0
12	Цукровий буряк	0,4	Бурякова мінуюча муха	14	1,7	Екз/ рослину			1,5			1,7	5,0	100	0	0
13			Бурякова листова попелиця	63	4,4	Екз/ рослину			4,5			4,4	9,0	100	0	0
14	Соняшник	0,5	Геліхризова попелиця	56	4,8	Екз/ рослину			5,5			4,8	11,0	100	0	0
15			Совка гамма	4	-	Екз/ кв.м			0,2			0,3	1,0	100	0	0
16			Совка С чорне	2	-	Екз/ кв.м			0,2			0,3	1,0	100	0	0
17	Озимий ріпак	0,4	Ріпаковий насінневий прихованохоботн ик	60	7,1	Екз/ рослину			1,0			7,1	7,5	100	0	0
18			Капустяна галиця	26	5,7	Екз/ рослину			14,0			5,7	6,0	100	0	0
19	Картопля	0,002	Колорадський жук	50	14,0	Екз/ рослину	2,0	1,0	8,0			14,0	32,0	100	0	0
20	Яблуня	0,03	Яблунева плодожерка	35	8,7	Екз/ дерево						1,2	3,0	100	0	0

Інформація

щодо ураження хворобами сільськогосподарських рослин в Тернопільській області

станом на 03 липня 2025 року

№ п/п	Назва культури	Обстежено, тис.га	Назва хвороби	У Р А Ж Е Н О, %						Розвиток хвороби, %	Загинуло рослин, %
				Площ	Рослин		Назва ураженого органу	Органів рослин			
					Середній	Максимальний		середній	максимальн.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Озима пшениця	0,6	Борошниста роса	43	11,4	23,0	листя	6,7	12,0	2,1	-
							стебло	11,4	23,0	5,7	
2			Септоріоз	10	0,5	2,0	листя	0,5	2,0	0,5	-
3			Піренофороз	18	5,6	12,0	листя	4,3	8,0	2,0	-
4			Бура іржа	9	2,9	6,0	листя	2,6	5,0	1,3	-
5			Фузаріоз колоса	19	0,9	3,0	колос	0,9	3,0	0,8	-
6			Альтернаріоз	5	0,4	20,	колос	0,4	2,0	0,5	-
7			Бактеріоз	2	0,2	1,0	колос	0,2	1,0	0,3	-
8			Оливкова плісень	3	0,3	1,0	колос	0,3	1,0	0,3	-
9	Ярий ячмінь	0,2	Гельмінтоспоріоз	100	10,2	21,0	листя	7,8	14,0	3,5	-
10			Ринхоспоріоз	42	5,6	11,0	листя	4,1	8,0	2,0	-
11	Горох	0,05	Аскохітоз	78	10,8	19,0	листя	7,3	14,0	3,4	-
12			Пероноспороз	78	6,2	11,0	листя	3,7	7,0	1,7	-

13	Кукурудза	0,4	Гельмінтоспоріоз	26	1,0	3,0	листя	0,5	2,0	0,5	-
14	Соя	0,5	Аскохітоз	33	3,3	8,0	листя	1,9	5,0	1,3	-
15			Пероноспороз	5	0,8	2,0	листя	0,6	2,0	0,5	-
16			Жовта мозаїка	2	0,3	1,0	листя	0,2	1,0	0,3	-
17	Соняшник	0,5	Пероноспороз	28	2,1	5,0	листя	1,0	3,0	0,8	-
18			Фомоз	5	0,6	2,0	листя	0,3	1,0	0,3	-
19	Цукровий буряк	0,4	Церкоспороз	22	0,8	3,0	листя	0,4	2,0	0,5	-
20	Конюшина	0,03	Аскохітоз	61	6,4	12,0	листя	3,6	7,0	1,8	-
21			Бура плямистість	23	3,1	6,0	листя	1,7	3,0	0,8	-
22			Борошниста роса	8	0,9	3,0	листя	0,6	2,0	0,5	-
23	Картопля	0,002	Фітофтороз	50	3,4	6,0	листя	1,6	3,0	0,8	-
24			Ризоктоніоз	15	1,8	3,0	листя	0,7	2,0	0,5	-
25	Цибуля	0,001	Пероноспороз	100	9,4	17,0	листя	5,2	10,0	2,5	-
26	Озимий ріпак	0,4	Альтернаріоз	43	8,3	15,0	стебло	8,3	15,0	3,7	-
							стручок	2,7	6,0	1,5	
27			Сіра гниль	6	1,2	3,0	стебло	1,2	3,0	-	-
28	Яблуня	0,03	Парша	54	10,6	21,0	листя	3,6	7,0	1,7	-
							пагони	0,4	2,0	0,5	