

10.07.2025

Оперативна інформація

щодо фітосанітарного стану агроценозів у Тернопільській області

Звітний тиждень на території Тернопільської області характеризувався жаркою погодою, наприкінці тижня спостерігалися опади у вигляді дощу з грозами та сильним поривчастим вітром.

Максимальна температура повітря вдень підвищувалася до +25...+34°C.

Мінімальна температура повітря вночі знижувалася до +17...+19°C.

Фенологія с/г культур

Озимі зернові – молочна, молочно - воскова стиглість;

Ярі зернові – цвітіння, молочна стиглість;

Кукурудза – 11- листків;

Горох – початок утворення бобів, II етап дозрівання;

Соя – бутонізація, цвітіння;

Соняшник – поява суцвіть;

Цукровий буряк – змикання рядків;

Озимий ріпак – формування насіння, дозрівання;

Картопля – цвітіння;

Капуста – формування качана;

Багаторічні трави – відростання;

Сад – ріст плодів.

Фітосанітарний стан агроценозів

В посівах кукурудзи відмічено заселення **травневим хрущем** 56% обстеженої площі, середня чисельність личинок складає 0,3 екз/кв.м., максимальна 1,0 екз/кв.м., пошкодженість рослин становить 0,5% в слабкому ступені.

Дротяниками заселено 71% обстежуваної площі кукурудзи. середня чисельність личинок складає 0,5 екз/кв.м., максимальна 1,0 екз/кв.м., пошкодженість рослин становить 1,4% в слабкому ступені.

В другій декаді липня в умовах вологої погоди буде збільшуватися шкідливість личинок у посівах кукурудзи.

Інформація
щодо поширення і чисельності шкідників сільськогосподарських рослин в Тернопільській області
станом на 10 липня 2025 року

№ п/п	Назва культури	Обстежено, тис.га	Назва шкідника	Заселено, %		Чисельність, екз.						Пошкоджено (сисними-заселено) рослин, бруньок, листків, суцвіть, плодів, %		Ступінь пошкодження, %		
				Площ	Рослин (дерев)	Одиниця виміру	Іма-го	Яй-це	Личинки		Енто-мо-фаги	Серед-ній	Макси-маль-ний	Слаб-кий	Сере-дній	Силь-ний
									Екз.	вік						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Озима пшениця	0,5	Злакові попелиці	3	2,2	Екз/колос			2,2			2,2	6,0	100	0	0
2			Хлібні клопи	4	0,4	Екз/колос	0,2		0,2			0,4	1,0	100	0	0
3			Хлібний жук кузька	8	0,5	Екз/колос	0,6					0,5	2,0	100	0	0
4	Ярий ячмінь	0,5	Злакові попелиці	18	0,8	Екз/рослину			1,5		1,0	0,8	3,0	100	0	0
5	Горох	0,04	Горохова галиця	42	0,7	Екз/рослину			4,0			0,7	2,0	100	0	0
6			Горохова зернівка	67	2,3	Екз/рослину			1,0			2,3	3,0	100	0	0
7			Горохова плодожерка	42	1,4	Екз/рослину			1,0			1,4	2,0	100	0	0
8	Соя	0,5	Соєва попелиця	31	2,5	Екз/рослину			2,2		1,0	2,5	6,0	100	0	0
9			Совка С чорне	2	0,3	Екз/100 п.с.			0,2			0,3	1,0	100	0	0
10			Тютюновий трипс	6	0,6	Екз/рослину			2,0			0,6	2,0	100	0	0

11	Кукурудза	0,5	Злакові попелиці	35	4,5	Екз/ рослину			4,5		1,0	4,5	11,0	100	0	0
12	Цукровий буряк	0,4	Бурякова мінуюча муха	14	1,7	Екз/ рослину			2,0			1,7	5,0	100	0	0
13			Бурякова листяна попелиця	40	3,5	Екз/ рослину			4,5			3,5	10,0	100	0	0
14	Соняшник	0,5	Геліхризова попелиця	30	5,0	Екз/ рослину			6,0			5,0	12,0	100	0	0
15	Озимий ріпак	0,4	Ріпаківий насі́нневий прихованохоботн ик	4	3,1	Екз/ рослину			1,0			3,1	5,0	100	0	0
16	Картопля	0,003	Колорадський жук	90	7,0	Екз/ рослину	0,8	1,0	4,0			7,0	11,0	100	0	0
17	Капуста	0,001	Капустяний білан	0,1	2,7	Екз/ рослину			4,0			2,7	4,0	100	0	0
18			Капустяна міль	0,2	3,1	Екз/ рослину			5,0			3,1	5,0	100	0	0
19	Яблуна	0,02	Яблунева плодожерка	65	10,3	Екз/ дерево						1,4	3,0	100	0	0

Інформація
щодо ураження хворобами сільськогосподарських рослин в Тернопільській області
станом на **10 липня 2025 року**

№ п/п	Назва культури	Обстежено, тис.га	Назва хвороби	У Р А Ж Е Н О, %						Розвиток хвороби, %	Загинуло рослин, %
				Площ	Рослин		Назва ураженого органу	Органів рослин			
					Середній	Максимальний		середній	максимальн.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Озима пшениця	0,5	Борошниста роса	55	8,1	15,0	листя	5,3	10,0	2,5	-
							стебло	4,5	6,0	1,5	
2			Септоріоз	10	0,5	2,0	листя	0,5	2,0	0,5	-
3			Фузаріоз колоса	17	1,0	3,0	колос	0,9	3,0	0,8	-
4			Альтернаріоз	7	0,6	2,0	колос	0,6	1,0	0,3	-
5			Бактеріоз	3	0,2	1,0	колос	0,2	1,0	-	-
6			Оливкова плісень	4	0,4	1,0	колос	0,4	1,0	0,3	-
7	Ярий ячмінь	0,5	Фузаріоз	3	0,5	2,0	листя	0,5	2,0	0,5	-
8			Гельмінтоспоріоз	9	5,2	21,0	листя	3,4	12,0	3,0	-
9	Горох	0,04	Аскохітоз	100	11,7	22,0	листя	7,8	15,0	3,7	-
10			Пероноспороз	100	7,8	13,0	листя	4,6	9,0	2,2	-
11	Кукурудза	0,5	Гельмінтоспоріоз	17	1,1	3,0	листя	0,5	2,0	0,5	-
12	Соя	0,5	Аскохітоз	27	3,7	9,0	листя	2,0	5,0	1,3	-

13			Септоріоз	9	0,9	2,0	листя	0,6	2,0	0,5	-
14			Пероноспороз	7	1,2	3,0	листя	0,8	2,0	0,5	-
15			Жовта мозаїка	3	0,4	1,0	листя	0,2	1,0	0,3	-
16	Соняшник	0,5	Пероноспороз	23	2,5	6,0	листя	1,2	3,0	0,8	-
17			Фомоз	6	0,8	2,0	листя	0,4	1,0	0,3	-
18	Цукровий буряк	0,4	Церкоспороз	19	1,0	3,0	листя	0,4	2,0	0,5	-
19	Озимий ріпак	0,4	Альтернаріоз	33	6,2	18,0	стебло	6,1	18,0	4,5	-
							стручок	2,1	6,0	1,5	
20			Біла гниль	3	0,5	2,0	стебло	0,5	2,0	-	-
21	Картопля	0,003	Фітофтороз	33	4,1	8,0	листя	1,9	4,0	1,0	-
22	Огірки	0,001	Пероноспороз	20	0,6	2,0	листя	0,3	1,0	0,3	-
23			Бактеріоз	40	0,9	2,0	листя	0,5	1,0	0,3	-
24	Яблуня	0,02	Парша	82	11,8	23,0	листя	4,3	8,0	2,0	-
							пагони	0,6	2,0	0,5	