

12.06.2025

Оперативна інформація

щодо фітосанітарного стану агроценозів у Тернопільській області

Звітний тиждень на території Тернопільської області характеризувався досить жаркою погодою, наприкінці тижня спостерігалось опади у вигляді дощу з грозами.

Максимальна температура повітря вдень підвищувалася до +21...+31°C.

Мінімальна температура повітря вночі знижувалася до +13...+16°C.

Фенологія с/г культур

Озимі зернові – цвітіння;
Озимий ячмінь – налив зерна;
Ярі зернові – початок колосіння;
Кукурудза – 6 - листок;
Горох – початок цвітіння;
Соя – 5 пара листків;
Цукровий буряк – 5 пара листків;
Соняшник – 7 пара листків;

Озимий ріпак – кінець цвітіння,
формування стручків;
Картопля – початок цвітіння;
Капуста – формування качана;
Багаторічні трави – відростання;
Сад – ріст плодів.

Фітосанітарний стан агроценозів

В посівах цукрових буряків відмічено живлення гусениць **озимої совки** I-II віків, середня чисельність 0,2 екз/кв.м., максимальна 1,0 екз/кв.м., пошкодженість рослин становить 0,3% в слабкому ступені.

В третій декаді червня в умовах теплої та вологої погоди буде проходити живлення гусениць озимої совки.

Інформація

щодо поширення і чисельності шкідників сільськогосподарських рослин в Тернопільській області

станом на 12 червня 2025 року

№ п/п	Назва культури	Обстежено, тис.га	Назва шкідника	Заселено, %		Чисельність, екз.						Пошкоджено (сисними-заселено) рослин, бруньок, листків, суцвіть, плодів, %		Ступінь пошкодження, %		
				Площ	Рослин (дерев)	Одиниця виміру	Іма-го	Яй-це	Личинки		Енто-мо-фаги	Серед-ній	Макси-маль-ний	Слаб-кий	Сере-дній	Силь-ний
									Екз.	вік						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Озима пшениця	0,6	Хлібні клопи	7	-	Екз/ кв.м	0,4	2,0				0,02	1,0	100	0	0
2			Злакові п'явиці	8	-	Екз/ кв.м		2,0				1,6	3,0	100	0	0
3			Злакові попелиці	26	0,7	Екз/ рослину			1,7		0,5	0,7	3,0	100	0	0
4			Пшеничний трипс	10	0,4	Екз/ рослину		1,0				0,4	1,0	100	0	0
5	Ярий ячмінь	0,4	Злакові попелиці	44	4,5	Екз/ рослину			3,0			4,5	10,0	100	0	0
6			Злакові п'явиці	6	-	Екз/ кв.м			3,0			3,2	4,0	100	0	0
7			Хлібні клопи	6	-	Екз/ кв.м	0,4					0,01	0,1	100	0	0
8	Горох	0,03	Горохова трипс	9	2,1	Екз/ рослину	1,3					2,1	4,0	100	0	0
9			Горохова попелиця	100	4,3	Екз/ рослину			4,0			4,3	8,0	100	0	0
10	Соя	0,2	Соєва попелиця	19	0,7	Екз/ рослину			1,0			0,7	2,0	100	0	0

11	Кукурудза	0,2	Злакові попелиці	8	1,8	Екз/ рослину			1,6			1,8	4,0	100	0	0
12	Цукровий буряк	0,2	Бурякова мінуюча муха	21	0,8	Екз/ рослину			1,7			0,8	2,0	100	0	0
13			Бурякова листова попелиця	36	1,4	Екз/ рослину	1,0		3,0			1,4	3,0	100	0	0
14	Соняшник	0,5	Геліхризова попелиця	29	2,0	Екз/ рослину	1,0		3,6			2,0	5,0	100	0	0
15	Озимий ріпак	0,5	Ріпаковий Насінневий прихованохоботн ик	24	3,2	Екз/ рослину	0,9		1,0			3,2	3,5	100	0	0
16			Капустяна галиця	12	1,8	Екз/ рослину			10,0			1,8	2,0	100	0	0
17	Картопля	0,003	Колорадський жук	100	18,0	Екз/ рослину	3,0	2,0	10,0			18,0	54,0	100	0	0
18	Капуста	0,001	Бариди	20	0,6	Екз/ рослину			2,0			0,6	2,0	100	0	0
19	Яблуня	0,04	Яблунева попелиця	56	32,0	Екз/ дерево			6,0			32,0	6,0	100	0	0
20			Яблунева плодожерка	8	2,9	Екз/ дерево						2,9	5,0	100	0	0
21			Яблуневий пильщик	11	2,3	Екз/ дерево						2,3	3,0	100	0	0

Інформація

щодо ураження хворобами сільськогосподарських рослин в Тернопільській області

станом на 12 червня 2025 року

№ п/п	Назва культури	Обстежено, тис.га	Назва хвороби	У Р А Ж Е Н О, %						Розвиток хвороби, %	Загинуло рослин, %
				Площ	Рослин		Назва ураженого органу	Органів рослин			
					Середній	Максимальний		середній	максимальн.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Озима пшениця	0,6	Борошниста роса	39	8,7	16,0	листя	4,3	9,0	2,2	-
							стебло	8,7	16,0	4,0	
2			Септоріоз	49	3,7	10,0	листя	2,8	8,0	2,0	-
3			Піренофороз	13	3,2	6,0	листя	2,1	4,0	1,0	-
4			Кореневі гнилі	14	1,6	3,5	корінь	1,6	4,0	-	-
5			Бура іржа	8	1,7	4,0	листя	1,3	1,0	0,3	-
6			Фузаріоз кореня	3	0,3	1,0	колос	0,3	1,0	-	-
7	Ярий ячмінь	0,4	Гельмінтоспоріоз	42	4,7	12,0	листя	2,5	7,0	1,8	-
8			Ринхоспоріоз	14	3,1	6,0	листя	1,8	4,0	1,0	-
9	Горох	0,03	Аскохітоз	100	4,2	8,0	листя	1,9	4,0	1,0	-
10			Пероноспороз	25	1,9	3,0	листя	1,1	2,0	0,5	-
11			Кореневі гнилі	13	0,8	2,0	корінь	0,8	2,0	-	-

12	Соя	0,2	Аскохітоз	7	0,9	2,0	листя	0,4	1,0	0,3	-
13	Столовий буряк	0,001	Церкоспороз	10	0,4	1,0	листя	0,2	1,0	0,3	-
14	Озимий ріпак	0,5	Пероноспороз	9	3,2	5,0	листя	1,6	3,0	0,8	-
15			Циліндроспоріоз	4	1,4	3,0	листя	0,7	2,0	0,5	-
16			Альтернаріоз	15	1,2	4,0	стебло	1,8	4,0	1,0	-
							стручок	0,4	1,0	0,3	
17	Цибуля	0,001	Пероноспороз	20	1,6	3,0	листя	0,7	2,0	0,5	-
18	Яблуня	0,04	Борошниста роса	69	7,0	16,0	листя	1,5	5,0	1,3	-
							пагони	0,8	2,0	0,5	
19			Парша	11	3,6	5,0	листя	0,8	2,0	0,5	-

**Інформація
щодо льоту метеликів лускокрилих комах в Тернопільській області станом на
12.06.2025 року**

№	Назва культури,стації	Площа, га		Шкідник		Інтенсивність льоту			Співвідношення		Середня кількість яєцьна самку
		обстеже но	заселено	назва	покоління	Одиниця обліку	Чисельність,екз.		самиці	самці	
							середня	максим.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Горох	32	32	Горохова плодожерка	I	Екз/ на ловче коритце за добу	2	4	46	54	60