

15.05.2025

Оперативна інформація

щодо фітосанітарного стану агроценозів у Тернопільській області

Впродовж звітного тижня на території Тернопільської області спостерігалася прохолодна погода, в окремі дні були опади у вигляді дощу, наприкінці тижня температура повітря дещо підвищилася.

Максимальна температура повітря вдень підвищувалася до +11...+16°C.

Мінімальна температура повітря вночі знижувалася до +1...+5°C.

Фенологія с/г культур

Озимі зернові – трубкування;
Ярі зернові – кущення, сходи;
Кукурудза – сходи, I пара листків;
Горох – 3-5 листки;
Цукровий буряк – I-II пара листків;
Соняшник – сходи, II пара листків;
Озимий ріпак – цвітіння;

Картопля – сходи, розвиток листя;
Соя – сходи;
Багаторічні трави – початок
бутонізації;
Сад – ріст плодів.

Фітосанітарний стан агроценозів

В посівах озимої пшениці (пл. 1,0 тис.га) **злаковою п'явицею** заселено 0,3% рослин на 14% обстежуваної площі, середня чисельність становить 1,1 екз/кв.м. **Злакові попелиці** заселили 0,8% рослин на 14% обстежуваної площі, середня чисельність становить 1,5 екз/рослину.

В посівах кукурудзи спостерігається пошкодження личинками **травневого хруща** 0,4% рослин в слабкому ступені, при чисельності 0,3-1,0 екз/кв.м.

Личинки **дротяників** пошкодили 0,6% рослин кукурудзи в слабкому ступені, при чисельності 0,5-1,0 екз/кв.м.

Септоріозом уражено 1,8-5,0% рослин на 10% площі, **борошнистою росою** уражено 2,8-6,0% рослин на 11% площі, **піренофорозом** уражено 0,9-3,0% рослин на 3% площі та **кореневими гнилями** уражено 0,8-3,0% рослин на 5% площі.

В посівах ярого ячменю (пл. 0,4 тис.га) спостерігається заселення 1,1% рослин **злаковими мухами** на 14% обстеженої площі, середня чисельність 0,7 екз/рослину. **Злаковою п'явицею** заселено 0,3% рослин на 23% обстежуваної площі, середня чисельність становить 0,6 екз/кв.м. **Злакові попелиці** заселили 1,1% рослин на 16% обстежуваної площі, середня чисельність становить 1,1 екз/рослину.

Спостерігається ураження 0,7-3,0% рослин ярого ячменю **гельмінтоспоріозом** на 22% обстеженої площі, **ринхоспоріозом** уражено 0,7-2,0% рослин на 6% площі. **Кореневі гнилі** уразили 0,6-2,0% рослин на 3% посівів ячменю.

В посівах кукурудзи (пл. 0,7 тис.га) **хлібною смугастою блішкою** пошкоджено 0,7-2,0% рослин на 9% площі, чисельність становить 0,3 екз/кв.м., **шведською мухою** пошкоджено 0,3-1,0% рослин на 2% площі, чисельність 0,2 екз/кв.м., **Злакові попелиці** заселили 0,2% рослин на 2% обстежуваної площі, середня чисельність становить 0,2 екз/рослину.

В посівах гороху (пл. 0,03 тис.га) **бульбочкових довгоносиків** виявлено на 100% площі, пошкоджено 3,1% рослин при чисельності 1,4 екз/кв.м. **Горохова попелиця** заселила 0,5% рослин на 56% обстеженої площі, при чисельності 1,0 екз/100 помахів сачком.

Кореневі гнилі уразили 0,5-2,0% рослин на 6% посівів гороху. **Аскохітозом** уражено 0,4-1,0% рослин на 9% обстеженої площі посівів гороху.

В посівах цукрового буряка (пл. 0,2 тис.га) **сірих бурякових довгоносиків** виявлено на 23% площі, пошкоджено 0,8% рослин при чисельності 0,2-0,3 екз/кв.м. **Буряковою блішкою** пошкоджено 0,9-3,0% рослин на 29% обстеженої площі, при чисельності 0,6 екз/кв.м. **Буряковою крихіткою** пошкоджено 0,8-2,0% рослин, на 14% площі, чисельність становить 1,0 екз/кв.м.

Коренейдом уражено 0,5-2,0% рослин на 11% площі.

В посівах соняшнику (пл. 0,3 тис.га) **сірих бурякових довгоносиків** виявлено на 19% площі, пошкоджено 1,6% рослин при чисельності 0,3 екз/кв.м. **Піщаним мідляком** пошкоджено 0,4% рослин на 8% обстеженої площі, при чисельності 0,2 екз/кв.м.

В посівах озимого ріпаку (пл. 0,4 тис.га) **ріпаковим насіннєвим прихованохоботником** пошкоджено 0,9-2,0% рослин на 8% обстежуваної площі, середня чисельність становить 0,6 екз/рослину. **Стебловим прихованохоботником** заселено 1,4% рослин на 10% обстежуваної площі, середня чисельність становить 1,0 екз/рослину. **Ріпаковим квіткоїдом** заселено 1,6% рослин на 8% площі, чисельність становить 1,06 екз/рослину.

Пероноспорозом уражено 1,9-5,0% рослин на 18% площі, **циліндроспоріозом** уражено 1,1-3,0% рослин на 11% площі.

В посадках картоплі (пл. 0,03 тис.га) **колорадським жуком** заселено 5,1% рослин на 40% площі, при чисельності 1,6 екз/рослину. **Ризоктоніозом** уражено 0,3-1,0% рослин на 7% площі.

В яблуневому саду (пл. 0,03 тис.га) спостерігається пошкодження 0,3-1,0% бутонів на 12% дерев **яблуневою медяницею**, чисельність становить 3,0-5,0 екз/дерево. **Яблунева міль** заселила 1,6% дерев яблуні на 12% площі, при чисельності 1,0 екз/дерево. **Розанова листокрутка** пошкодила 0,4-1,0% дерев на 12% площ яблуневому саду, чисельність 1,0 екз/100 листових розеток. **Червоними плодовими кліщами** заселено 3,8% дерев яблуні на 8% обстежених площ, чисельність 1,0 екз/гілки.

Виявлено ураження 2,3-5,0% дерев та 0,6-2,0% листків яблуні **борошнистою россою** на 27% обстежених площ.