

17.07.2025

Інформаційне повідомлення щодо фітосанітарного стану агроценозів у Тернопільській області

Впродовж звітного тижня на території Тернопільської області була тепла погода, в окремі дні були невеликі опади, у вигляді дощу.

Максимальна температура повітря вдень підвищувалася до +22...+30°C.

Мінімальна температура повітря вночі знижувалася до +16...+18°C.

Фенологія с/г культур

Озима пшениця – молочно - воскова, воскова стиглість;	Соняшник – утворення суцвіть;
Озимий ячмінь - воскова стиглість, збір врожаю;	Цукровий буряк – змикання рядків;
Ярі зернові – молочна, молочно-воскова стиглість;	Озимий ріпак – формування насіння, дозрівання;
Кукурудза – початок викидання волоті;	Картопля – цвітіння;
Горох – початок утворення бобів;	Капуста – формування качана;
Соя – бутонізація, цвітіння;	Багаторічні трави – бутонізація;
	Сад – ріст плодів.

Фітосанітарний стан агроценозів

В посівах кукурудзи відмічено літ ***стеблового метелика***. Інтенсивність льоту складає 1,0 екз/10 хв. в полі зору , максимально - 2,0 екз/100 хв. В полі зору. Відбувається відкладання яєць. Стебловим метеликом заселено 14% площі, середня чисельність 1 клад./рос, максимальна 2 клад./рос, середня чисельність яєць 4 штук/клад., максимальна 10 штук/клад.

В третій декаді липня буде продовжуватися літ метеликів, відкладання яєць, почнеться відродження та живлення гусениць.

Інформація
щодо поширення і чисельності шкідників сільськогосподарських рослин в Тернопільській області
станом на 17 липня 2025 року

№ п/п	Назва культури	Обстежено, тис.га	Назва шкідника	Заселено, %		Чисельність, екз.						Пошкоджено (сисними-заселено) рослин, бруньок, листків, суцвіть, плодів, %		Ступінь пошкодження, %		
				Площ	Рослин (дерев)	Одиниця виміру	Іма-го	Яй-це	Личинки		Енто-мо-фаги	Серед-ній	Макси-маль-ний	Слаб-кий	Сере-дній	Силь-ний
									Екз.	вік						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Озима пшениця	0,5	Злакові попелиці	3	2,2	Екз/колос			2,2			2,2	6,0	100	0	0
2			Хлібні клопи	7	0,7	Екз/колос	0,3		0,2			0,7	2,0	100	0	0
3			Хлібний жук кузька	13	1,1	Екз/колос	0,6					1,1	3,0	100	0	0
4	Ярий ячмінь	0,3	Злакові попелиці	9	0,4	Екз/рослину			1,0			0,4	2,0	100	0	0
5	Горох	0,04	Горохова галиця	63	1,3	Екз/рослину			5,0			1,3	2,0	100	0	0
6			Горохова зернівка	75	3,4	Екз/рослину			1,0			3,4	5,0	100	0	0
7			Горохова плодожерка	58	2,6	Екз/рослину			1,0			2,6	4,0	100	0	0
8	Соя	0,4	Соєва попелиця	39	3,1	Екз/рослину			2,2		1,0	3,1	8,0	100	0	0
9			Тютюновий трипс	7	1,4	Екз/рослину			2,0			1,4	3,0	100	0	0
10	Кукурудза	0,5	Злакові попелиці	43	4,8	Екз/рослину			4,5		1,0	4,8	12,0	100	0	0

11	Цукровий буряк	0,3	Бурякова мінуюча муха	20	1,9	Екз/рослину			2,0			1,9	5,0	100	0	0
12			Бурякова листкова попелиця	50	3,8	Екз/рослину			4,5			3,8	11,0	100	0	0
13	Соняшник	0,5	Геліхризова попелиця	34	5,3	Екз/рослину			6,5		1,0	5,3	12,0	100	0	0
14			Совка С чорне	5	-	Екз/кв.м			0,3			0,4	1,0	100	0	0
15	Озимий ріпак	0,4	Ріпаковий насінневий прихованохоботник	12	3,1	Екз/рослину			1,0			3,1	5,0	100	0	0
16	Конюшина	0,02	Конюшинний насіннеїд (аніон)	100	10,7	Екз/рослину	1,0					10,7	18,0	100	0	0
17	Картопля	0,003	Колорадський жук	100	8,0	Екз/рослину	1,0	1,0	4,5			8,0	16,0	100	0	0
18	Капуста	0,001	Капустяна попелиця	70	5,6	Екз/рослину			11,0			5,6	10,0	100	0	0
19			Капустяна міль	40	3,9	Екз/рослину			5,0			3,9	7,0	100	0	0
20	Яблуня	0,02	Яблунева плодожерка	71	13,6	Екз/дерево						1,5	14,0	100	0	0

Інформація

щодо ураження хворобами сільськогосподарських рослин в Тернопільській області

станом на 17 липня 2025 року

№ п/п	Назва культури	Обстежено, тис.га	Назва хвороби	У Р А Ж Е Н О, %						Розвиток хвороби, %	Загинуло рослин, %
				Площ	Рослин		Назва ураженого органу	Органів рослин			
					Середній	Максимальний		середній	максимальн.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Озима пшениця	0,5	Борошниста роса	58	8,1	15,0	листя	5,3	10,0	2,5	-
							стебло	4,5	6,0	1,5	
2			Септоріоз	20	0,8	3,0	листя	0,8	3,0	0,8	-
3			Фузаріоз колоса	25	1,5	4,0	колос	1,3	4,0	1,0	-
4			Альтернаріоз	8	0,9	2,0	колос	0,9	2,0	0,5	-
5			Бактеріоз	3	0,4	2,0	колос	0,4	2,0	-	-
6			Оливкова плямистість	12	0,6	2,0	колос	0,6	2,0	0,5	-
7	Ярий ячмінь	0,3	Гельмінтоспоріоз	11	4,2	21,0	листя	3,2	12,0	3,0	-
8	Горох	0,04	Аскохітоз	100	12,6	24,0	листя	8,7	16,0	4,0	-
9			Пероноспороз	100	8,4	16,0	листя	5,8	11,0	2,7	-
10	Кукурудза	0,5	Гельмінтоспоріоз	23	1,4	4,0	листя	0,6	3,0	0,8	-
11	Соя	0,4	Аскохітоз	30	3,9	10,0	листя	2,2	6,0	1,5	-
12			Септоріоз	10	1,2	3,0	листя	0,7	2,0	0,5	-

13			Пероноспороз	23	1,7	4,0	листя	0,9	2,0	0,5	-
14			Жовта мозаїка	9	0,6	1,0	листя	0,3	1,0	-	-
15	Соняшник	0,5	Пероноспороз	21	4,6	8,0	листя	2,7	5,0	1,3	-
16			Фомоз	6	1,1	3,0	листя	0,6	2,0	0,5	-
17	Цукровий буряк	0,3	Церкоспороз	23	1,3	4,0	листя	0,5	2,0	0,5	-
18	Озимий ріпак	0,4	Альтернarioз	40	6,8	21,0	стебло	6,7	21,0	4,5	-
							стручок	2,4	8,0	2,0	
19			Біла гниль	3	0,8	3,0	стебло	0,9	3,0	-	-
20	Конюшина	0,02	Аскохітоз	100	8,3	16,0	листя	5,2	10,0	2,5	-
21			Бура плямистість	44	3,6	7,0	листя	2,1	4,0	1,0	-
22			Борошниста роса	19	1,4	3,0	листя	0,9	2,0	0,5	-
23	Картопля	0,003	Фітофтороз	33	8,7	14,0	листя	3,4	6,0	1,5	-
24			Ризоктоніоз	10	2,3	4,0	листя	1,2	3,0	0,8	-
25	Цибуля	0,001	Пероноспороз	100	7,6	14,0	листя	5,1	10,0	2,5	-
26	Яблуня	0,02	Плодова гниль	12	1,7	4,0	плоди	0,3	1,0	-	-
27			Парша	100	14,3	26,0	листя	5,6	11,0	2,7	-
							пагони	0,8	2,0	0,5	

**Інформація
щодо льоту метеликів лускокрилих комах в Тернопільській області станом на
17.07.2025 року**

№	Назва культури,стації	Площа, га		Шкідник		Інтенсивність льоту			Співвідношення		Середня кількість яєцьна самку
		обстеже но	заселено	назва	покоління	Одиниця обліку	Чисельність,екз.		самиці	самці	
середня	максим.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Кукурудза	168	23	Стебловий метелик	I	Екз/ за 10 хв. В полі зору	1	2	48	52	220