

19.06.2025

Інформаційне повідомлення

щодо фітосанітарного стану агроценозів у Тернопільській області

Впродовж звітного тижня на території Тернопільської області була тепла погода, в окремі дні було досить спекотно, наприкінці тижня спостерігалось підвищення температури повітря.

Максимальна температура повітря вдень підвищувалася до +19...+29°C.

Мінімальна температура повітря вночі знижувалася до +13...+15°C.

Фенологія с/г культур

Озимі зернові – кінець цвітіння, молочна стиглість;

Озимий ячмінь – налив зерна;

Ярі зернові – початок колосіння;

Кукурудза – 8-9 - листок;

Горох – цвітіння;

Соя – 6 пара листків;

Цукровий буряк – утворення розетки листків;

Соняшник – 8 пара листків, поява суцвіть;

Озимий ріпак – формування насіння;

Картопля – цвітіння;

Капуста – формування качана;

Багаторічні трави – відростання;

Сад – ріст плодів.

Фітосанітарний стан агроценозів

В посівах цукрових буряків відмічено живлення гусениць *озимої совки* I-II віків, середня чисельність 0,3 екз/кв.м., максимальна 1,0 екз/кв.м., пошкодженість рослин становить 0,4% в слабкому ступені.

В третій декаді червня в умовах теплої та вологої погоди буде проходити живлення гусениць озимої совки.

Відмічено ураження соняшнику *білою гниллю* на прикореневій частині стебла.

Триває заселення та шкідливість на рослинах капусти гусениць *капустяної молі*, якою пошкоджено 4,5% рослин, при середній чисельності 5,5 екз/рослину; *слимаками* пошкоджено 5,5% рослин; гусеницями *листогризучих совок* пошкоджено 2,5% рослин, при середній чисельності 1,5 екз/рослину та *підгризаючими совками* пошкоджено 1,5% рослин, при чисельності 0,4 екз/кв.м..

Інформація
щодо поширення і чисельності шкідників сільськогосподарських рослин в Тернопільській області
станом на 19 червня 2025 року

№ п/п	Назва культури	Обстежено, тис.га	Назва шкідника	Заселено, %		Чисельність, екз.						Пошкоджено (сисними-заселено) рослин, бруньок, листків, суцвіть, плодів, %		Ступінь пошкодження, %		
				Площ	Рослин (дерев)	Одиниця виміру	Іма-го	Яй-це	Личинки		Енто-мо-фаги	Серед-ній	Макси-маль-ний	Слаб-кий	Сере-дній	Силь-ний
									Екз.	вік						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Озима пшениця	0,9	Хлібні клопи	3	-	Екз/ кв.м			0,5			0,1	0,4	100	0	0
2			Злакові п'явиці	7	-	Екз/ кв.м			0,2			0,7	2,0	100	0	0
3			Злакові попелиці	27	1,9	Екз/ рослину			1,4			1,9	5,0	100	0	0
4			Пшеничний трипс	10	1,2	Екз/ рослину			1,0			1,2	3,0	100	0	0
5	Ярий ячмінь	0,4	Злакові попелиці	19	0,8	Екз/ рослину			0,7			0,8	3,0	100	0	0
6	Горох	0,03	Горохова трипс	56	2,7	Екз/ рослину			2,0			2,7	5,0	100	0	0
7			Горохова попелиця	100	6,2	Екз/ рослину			5,0			6,2	11,0	100	0	0
8	Соя	0,5	Соєва попелиця	20	1,3	Екз/ рослину			1,2			1,3	3,0	100	0	0
9			Нестадні види саранових	4	0,3	Екз/ 100 п.с.			0,8			0,3	1,0	100	0	0
10	Кукурудза	0,2	Злакові попелиці	63	3,1	Екз/ рослину			2,0			3,1	6,0	100	0	0

11	Цукровий буряк	0,4	Бурякова мінуюча муха	15	1,4	Екз/рослину			2,0			1,4	3,0	100	0	0
12			Бурякова листкова попелиця	31	2,2	Екз/рослину			2,5			2,2	5,0	100	0	0
13	Соняшник	0,6	Геліхризова попелиця	31	2,5	Екз/рослину			2,0			2,5	4,0	100	0	0
14	Озимий ріпак	0,8	Ріпаковий насіннєвий прихованохоботник	12	4,2	Екз/рослину			1,0			4,2	4,5	100	0	0
15			Капустяна галиця	9	2,8	Екз/рослину			12,0			2,8	3,0	100	0	0
16	Картопля	0,006	Колорадський жук	100	43,0	Екз/рослину	2,0	1,0	9,0			43,0	69,0	100	0	0
17	Капуста	0,001	Бариди	20	0,6	Екз/рослину			2,0			0,6	2,0	100	0	0
18			Капустяна попелиця	30	2,4	Екз/рослину			5,0			2,4	5,0	100	0	0
19	Яблуня	0,03	Яблунева попелиця	38	36,0	Екз/дерево			7,0			1,5	4,0	100	0	0
20			Яблунева плодожерка	15	2,3	Екз/дерево						2,3	1,0	100	0	0

Інформація

щодо ураження хворобами сільськогосподарських рослин в Тернопільській області

станом на 19 червня 2025 року

№ п/п	Назва культури	Обстежено, тис.га	Назва хвороби	У Р А Ж Е Н О, %						Розвиток хвороби, %	Загинуло рослин, %
				Площ	Рослин		Назва ураженого органу	Органів рослин			
					Середній	Максимальний		середній	максимальн.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Озима пшениця	0,9	Борошниста роса	29	10,3	21,0	листя	5,8	11,0	2,7	-
							стебло	10,3	21,0	5,2	
2			Септоріоз	33	4,8	14,0	листя	3,6	10,0	2,0	-
3			Піренофороз	14	3,1	9,0	листя	2,4	6,0	1,5	-
4			Кореневі гнилі	9	1,8	5,0	корінь	1,8	5,0	-	-
5			Бура іржа	5	2,4	5,0	листя	1,9	4,0	1,0	-
6			Фузаріоз кореня	2	0,4	1,0	колос	0,4	1,0	-	-
7	Ярий ячмінь	0,4	Гельмінтоспоріоз	59	5,6	16,0	листя	3,2	10,0	2,5	-
8			Ринхоспоріоз	17	4,8	9,0	листя	3,1	6,0	1,5	-
9			Борошниста роса	8	4,8	9,0	листя	3,1	6,0	1,5	-
10	Горох	0,03	Аскохітоз	100	6,3	12,0	листя	3,8	7,0	1,8	-
11			Пероноспороз	32	3,2	6,0	листя	2,1	4,0	1,0	-
12			Кореневі гнилі	16	0,9	2,0	корінь	0,9	2,0	-	-

13	Соя	0,5	Аскохітоз	5	1,7	3,0	листя	0,6	2,0	0,5	-
14			Кореневі гнилі	6	0,7	2,0	листя	0,4	1,0	0,3	-
15	Соняшник	0,6	Пероноспороз	4	0,8	2,0	листя	0,4	1,0	0,3	-
16	Столовий буряк	0,001	Церкоспороз	30	1,1	3,0	листя	0,6	2,0	0,5	-
17			Рамуляріоз	10	0,4	1,0	листя	0,3	1,0	0,3	-
18	Картопля	0,006	Альтернаріоз	3	0,8	2,0	листя	0,6	2,0	0,5	-
19	Озимий ріпак	0,8	Пероноспороз	6	3,2	5,0	листя	1,6	3,0	0,8	-
20			Циліндроспоріоз	4	1,4	3,0	листя	0,8	2,0	0,5	-
21			Альтернаріоз	12	1,2	6,0	стебло	2,0	6,0	1,5	-
							стручок	0,7	2,0	0,5	
22	Яблуня	0,03	Борошниста роса	65	12,6	24,0	листя	3,4	6,0	1,5	-
							пагони	1,2	3,0	0,8	
23			Парша	23	5,2	9,0	листя	1,2	3,0	0,8	-