

21.08.2025

Оперативна інформація

щодо фітосанітарного стану агроценозів у Тернопільській області

Звітний тиждень на території Тернопільської області характеризувався сонячною погодою без опадів, наприкінці тижня спостерігалися незначне підвищення температури.

Максимальна температура повітря вдень підвищувалася до +20...+27°C.

Мінімальна температура повітря вночі знижувалася до +10...+12°C.

Фенологія с/г культур

Кукурудза – молочно-воскова стиглість;	Картопля – в'янення бадилля;
Соя – налив зерна;	Багаторічні трави – початок дозрівання;
Соняшник – цвітіння кошиків, досягання;	Сад – ріст плодів.
Цукровий буряк – ріст коренеплодів;	

Фітосанітарний стан агроценозів

В стерні озимих зернових (пл. 0,2 тис.га) виявлено заселення 100% площі *мишоподібними гризунами*. Середня чисельність 2,2 жилих колоній/га, максимальна чисельність 3,0 жилих колоній/га (2,0-4,0 жилих нір/колонію).

В третій декаді серпня, при сухій погоді буде продовжуватися живлення гризунами рештками озимих зернових, проходитиме заселення просапних посівів, шкідливість зростатиме.

В посівах цукрових буряків проходить відродження та живлення гусениць *озимої совки* I-II віків, середня чисельність 0,3 екз/кв.м., максимальна 1,0 екз/кв.м., пошкодженість рослин становить 0,9% в слабкому ступені.

В третій декаді серпня в умовах теплої та вологої погоди буде проходити живлення гусениць озимої совки.

Інформація
щодо поширення і чисельності шкідників сільськогосподарських рослин в Тернопільській області
станом на **21 серпня 2025 року**

№ з/п	Назва культури	Обстежено, тис.га	Назва шкідника	Заселено, %		Чисельність, екз.						Пошкоджено (сисними-заселено) рослин, бруньок, листків, суцвіть, плодів, %		Ступінь пошкодження, %		
				площ	рослин (дерев)	одиниця виміру	іма-го	яйце	личинки		ентомофаги	середній	максимальний	слабкий (до 25% рослин)	середній (26-50% рослин)	сильний (51% і більше)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Кукурудза	0,8	Злакові попелиці	21	8,1	Екз/рослину			11,0		2,0	8,1	10,0	100	0	0
2			Стебловий метелик	11	3,1	Екз/рослину			1	II-III		3,1 0,4 качан	6,0 1	100	0	0
3			Бавовникова совка	4	-	Екз/кв.м.			0,3			0,9	2,0	100	0	0
4	Соя	0,6	Сосва попелиця	83	7,4	Екз/рослину			6,0		1,0	7,4	15,0	100	0	0
5			Бавовникова совка	4	-	Екз/кв.м.			0,3			0,9	2,0	100	0	0
6			Тютюновий трипс	14	4,2	Екз/рослину			3,0			4,2	9,0	100	0	0
7			Павутинний кліщ	11	1,9	Екз/рослину			3,0			1,9	4,0	100	0	0
8	Цукровий буряк	0,6	Бурякова мінуюча муха	9	1,7	Екз/рослину			1,0			1,7	4,0	100	0	0
9			Бурякова листкова попелиця	98	3.8	Екз/рослину			4.0		1,0	3.8	8.0	100	0	0

10			Совка С - чорне	3	-	Екз/ кв.м.			0,3			0,4	1,0	100	0	0
11	Соняшник	0,6	Бавовникова совка	6	0,8	Екз/ рослину			0,3			0,8	2,0	100	0	0
12			Стебловий (кукурудзяний) метелик	9	0,7	Екз/ рослину			1,0	I-II		0,7	3,0	100	0	0
13	Капуста	0,002	Капустяна совка	15	-	Екз/ кв.м.			0,3			2.4	5,0	100	0	0
14			Слимак сітчастий	10	3,6	Екз/ рослину			4,0			3,6	6,0	100	0	0
15	Яблуня	0,03	Яблунева плодожерка	65	37.4	% пошкоджених плодів						4,1	8,0	100	0	0

Інформація
щодо ураження хворобами сільськогосподарських рослин в Тернопільській області
станом на **21 серпня 2025 року**

№ з/п	Назва культури	Обстежено, тис.га	Назва хвороби	У Р А Ж Е Н О, %						Розвиток хвороби, %	Загинуло рослин, %
				Площ	Рослин		Назва ураженого органу	Органів рослин			
					середній	максимальний		середній	максимальний		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Кукурудза	0,8	Гельмінтоспоріоз	41	10,5	21.0	листя	7,3	13,0	3,2	-
2			Пухирчаста сажка	4	1,1	3,0	стебло	1,1	3,0	0,8	-
3							качан	0,2	1,0	0,3	-
3			Фузаріоз початків	2	0,3	1,0	качан	0,3	1,0	0,3	-
4	Соя	0,6	Аскохітоз	83	9,2	20,0	листя	7,5	15,0	3,8	-
5			Септоріоз	24	3,3	7,0	листя	2,3	6,0	1,5	-
6			Пероноспороз	27	4,4	9,0	листя	3,0	6,0	1,5	-
7			Жовта мозаїка	10	2,9	6,0	листя	2,1	4,0	-	-
8			Бактеріальний опік	7	1,8	4,0	листя	1,3	3,0	-	-
9	Соняшник	0,6	Пероноспороз	84	9,8	20,0	листя	6,7	14,0	3,5	-
10			Фомоз	31	4,7	10,0	листя	3,5	7,0	1,6	-
11			Септоріоз	16	3,2	7,0	листя	2,3	5,0	1,3	-
12			Вертицильозне в'янення	3	0,9	2,0	листя	0,9	2,0	-	-

13			Сіра гниль	2	0,3	1,0	кошик	0,3	1,0	0,3	-
14			Біла гниль	3	0,5	2,0	кошик	0,5	2,0	-	-
15	Цукровий буряк	0,6	Церкоспороз	47	7,2	16,0	листя	5,4	12,0	3,0	-
16			Фомоз	14	2,6	6,0	листя	1,9	4,0	1,0	-
17			Рамуляріоз	10	32,	7,0	листя	2,5	5,0	1,3	-
18			Вірусна жовтяниця	6	1,2	3,0	листя	0,8	2,0	-	-
19			Кореневі гнилі	3	0,6	2,0	корінь	0,6	2,0	-	-
20	Капуста	0,002	Судинний бактеріоз	15	1,6	3,0	листя	1,1	2,0	-	-
21			Слизовий бактеріоз	10	0,3	1,0	листя	0,2	1,0	-	
22	Яблуня	0,03	Плодова гниль	38	8,4 дерев	16,0 дерев	плоди	1,6	3,0	-	-
23			Парша	65	34,2 дерев	53,0 дерев	листя	10,2	20,4	5,0	-
							плоди	2,7	6,0	1,5	