

23.07.2025

Оперативна інформація

щодо фітосанітарного стану агроценозів у Тернопільській області

Звітний тиждень на території Тернопільської області характеризувався жаркою погодою, наприкінці тижня спостерігалися невеликі опади у вигляді дощу з грозами.

Максимальна температура повітря вдень підвищувалася до +25...+30°C.

Мінімальна температура повітря вночі знижувалася до +17...+19°C.

Фенологія с/г культур

Озима пшениця – воскова стиглість;

Озимий ячмінь - збір врожаю;

Ярі зернові – воскова стиглість;

Кукурудза – викидання волоті, початок цвітіння;

Горох – дозрівання;

Соя – бутонізація, цвітіння;

Соняшник – цвітіння;

Цукровий буряк – змикання рядків;

Озимий ріпак – дозрівання;

Картопля – формування бульб;

Багаторічні трави – відростання;

Сад – ріст плодів.

Фітосанітарний стан агроценозів

В стерні озимого ячменю (60 га) виявлено заселення 100% площі *мишоподібними гризунами*. Середня чисельність 1,7 жилих колоній/га, максимальна чисельність 4,0 жилих колоній/га (3,0-5,0 жилих нір/колонію).

В посівах озимої пшениці середня чисельність 1,3 жилих колоній/га, максимально 2,0 жилих колоній/га (1,0-3,0 жилих нір/колонію).

В третій декаді липня, при сухій погоді буде продовжуватися живлення гризунами рештками озимих зернових, проходить заселення просапних посівів, шкідливість зростатиме.

**Начальник Управління
фітосанітарної безпеки**

Віктор ГРИЦІВ

Інформація

щодо поширення і чисельності шкідників сільськогосподарських рослин в Тернопільській області станом на **23 липня 2025 року**

№ п/п	Назва культури	Обсте жено, тис.га	Назва шкідника	Заселено, %		Чисельність, екз.						Пошкоджено (сисними- заселено) рослин, бруньок, листків, суцвіть, плодів, %		Ступінь пошкодження, %		
				Площ	Рослин (дерев)	Одиниця виміру	Іма- го	Яй- це	Личинки		Енто- мо- фаги	Серед- ній	Макси- маль- ний	Слаб- кий	Сере- дній	Силь- ний
									Екз.	вік						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Озима пшениця	0,8	Хлібні клопи	8	1,2	Екз/ колос	0,3		0,2			1,2	3,0	100	0	0
2			Хлібний жук кузька	11	1,6	Екз/ колос	0,6		0,3			1,6	4,0	100	0	0
3	Ярий ячмінь	0,3	Злакові попелиці	30	0,3	Екз/ рослину			1,0			0,3	2,0	100	0	0
4	Соя	0,7	Соєва попелиця	25	3,5	Екз/ рослину			2,7		1,0	3,5	10,0	100	0	0
5			Тютюновий трипс	7	2,4	Екз/ рослину			2,0			2,4	5,0	100	0	0
6			Павутинний кліщ	2	0,6	Екз/ рослину			1,0			0,6	2,0	100	0	0
7	Кукурудза	0,9	Злакові попелиці	25	4,6	Екз/ рослину			5,0		1,0	4,6	14,0	100	0	0
8			Стебловий метелик	3	0,5	Екз/ рослину			1,0	I-II		0,5	2,0	100	0	0
9	Цукровий буряк	0,4	Бурякова мінующая муха	18	2,2	Екз/ рослину			2,0			2,2	5,0	100	0	0
10			Бурякова листова попелиця	45	4,0	Екз/ рослину			4,5			4,0	12,0	100	0	0

11	Цукровий буряк	0,4	Бурякова щитоноска	4	0,4	Екз/рослину	0,2					0,4	1,0	100	0	0
12	Соняшник	0,6	Геліхризова попелиця	34	5,6	Екз/рослину			7,0		1,0	5,6	14,0	100	0	0
13			Стебловий метелик	1	-	Екз/кв.м			0,2			0,3	1,0	100	0	0
14	Конюшина	0,03	Конюшинний насіннеїд (аніон)	62	11,8	Екз/рослину			1,0	I-II		11,8	23,0	100	0	0
15	Капуста	0,002	Капуста совка	10	1,8	Екз/рослину			3,0			1,8	3,0	100	0	0
16			Капустяна білокрилка	25	7,4	Екз/рослину			16,0			7,4	15,0	100	0	0
17			Слимак сітчастий	5	0,9	Екз/рослину	2,0					0,9	3,0	100	0	0
18	Яблуня	0,03	Яблунева плодожерка	54	19,6	Екз/дерево						2,1	5,0	100	0	0

Інформація

щодо ураження хворобами сільськогосподарських рослин в Тернопільській області

станом на **23 липня 2025 року**

№ п/п	Назва культури	Обстежено, тис.га	Назва хвороби	У Р А Ж Е Н О, %						Розвиток хвороби, %	Загинуло рослин, %
				Площ	Рослин		Назва ураженого органу	Органів рослин			
					Середній	Максимальний		середній	максимальн.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Озима пшениця	0,8	Борошниста роса	37	4,3	15,0	листя	5,5	10,0	2,5	-
							стебло	4,5	6,0	1,5	
2			Септоріоз	19	4,2	7,0	колос	1,7	7,0	1,7	-
3			Фузаріоз колоса	22	2,4	9,0	колос	2,3	9,0	2,2	-
4			Альтернаріоз	8	1,5	4,0	колос	1,5	4,0	1,0	-
5			Бактеріоз	4	0,6	2,0	колос	0,6	2,0	-	-
6			Оливкова плямистість	6	1,2	3,0	колос	1,2	3,0	0,8	-
7	Ярий ячмінь	0,3	Гельмінтоспоріоз	11	4,2	21,0	листя	3,2	12,0	3,0	-
8	Кукурудза	0,9	Гельмінтоспоріоз	23	1,4	4,0	листя	0,6	3,0	0,8	-
9			Пухирчаста сажка	11	4,2	21,0	листя	3,2	12,0	3,0	-
10	Соя	0,7	Аскохітоз	23	4,6	12,0	листя	2,6	7,0	1,7	-
11			Септоріоз	9	1,4	3,0	листя	0,8	2,0	0,5	-
12			Пероноспороз	10	2,6	5,0	листя	1,4	3,0	0,7	-

13			Жовта мозаїка	4	0,9	3,0	листя	0,6	2,0	-	-
14	Соя	0,7	Бактеріальний опік	2	0,4	1,0	листя	0,3	1,0	-	-
15	Соняшник	0,6	Пероноспороз	23	5,4	10,0	листя	3,6	7,0	1,8	-
16			Фомоз	8	1,7	4,0	листя	0,8	2,0	0,5	-
17	Цукровий буряк	0,4	Церкоспороз	26	3,8	6,0	листя	1,9	4,0	1,0	-
18			Фомоз	4	0,7	2,0	листя	0,5	1,0	0,3	-
19			Рамуляріоз	3	0,5	2,0	листя	0,3	1,0	0,3	-
20	Конюшина	0,03	Аскохітоз	62	9,7	18,0	листя	6,4	12,0	3,0	-
21			Антракноз	35	5,4	10,0	листя	4,1	8,0	2,0	-
22			Борошниста роса	19	2,1	4,0	листя	1,4	3,0	0,8	-
23	Огірки	0,001	Пероноспороз	100	3,6	7,0	листя	1,8	3,0	0,8	-
24			Бактеріоз	100	2,8	4,0	листя	1,6	3,0	0,8	-
25	Помідори	0,001	Фітофтороз	100	4,3	8,0	листя	2,6	5,0	1,3	-
26	Яблуня	0,03	Плодова гниль	19	3,2	7,0	плоди	0,5	2,0	-	-
27			Парша	65	17,4	32,0	листя	6,4	13,0	3,2	-
							пагони	1,2	3,0	0,8	

**Інформація
щодо льоту метеликів лускокрилих комах в Тернопільській області станом на
23.07.2025 року**

№	Назва культури,стації	Площа, га		Шкідник		Інтенсивність льоту			Співвідношення		Середня кількість яєцьна самку
		обстеже но	заселено	назва	покоління	Одиниця обліку	Чисельність,екз.		самиці	самці	
							середня	максим.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Яблуня	17	17	Яблунева плодожерка	II	Екз/ ловче коритце за добу	1	3	48	52	120