

26.06.2025

Оперативна інформація

щодо фітосанітарного стану агроценозів у Тернопільській області

Звітний тиждень на території Тернопільської області характеризувався теплою погодою, з сильними поривами вітру, наприкінці тижня спостерігалось невеликі опади у вигляді дощу та підвищення температури повітря.

Максимальна температура повітря вдень підвищувалася до +21...+28°C.

Мінімальна температура повітря вночі знижувалася до +10...+16°C.

Фенологія с/г культур

Озима пшениця – молочна стиглість;

Озимий ячмінь – налив зерна;

Ярі зернові – цвітіння;

Кукурудза – 9- листків;

Горох – початок утворення бобів;

Соя – бутонізація;

Цукровий буряк – змикання рядків;

Соняшник – поява суцвіть;

Озимий ріпак – формування насіння;

Картопля – цвітіння;

Капуста – формування качана;

Багаторічні трави – відростання;

Сад – ріст плодів.

Фітосанітарний стан агроценозів

В посівах цукрових буряків відмічено живлення гусениць *озимої совки* I-II віків, середня чисельність 0,3 екз/кв.м., максимальна 1,0 екз/кв.м., пошкодженість рослин становить 0,6% в слабкому ступені.

В третій декаді червня в умовах теплої та вологої погоди буде проходити живлення гусениць озимої совки.

Інформація
щодо поширення і чисельності шкідників сільськогосподарських рослин в Тернопільській області
станом на 26 червня 2025 року

№ п/п	Назва культури	Обстежено, тис.га	Назва шкідника	Заселено, %		Чисельність, екз.						Пошкоджено (сисними-заселено) рослин, бруньок, листків, суцвіть, плодів, %		Ступінь пошкодження, %		
				Площ	Рослин (дерев)	Одиниця виміру	Іма-го	Яй-це	Личинки		Енто-мо-фаги	Серед-ній	Макси-маль-ний	Слаб-кий	Сере-дній	Силь-ний
									Екз.	вік						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Озима пшениця	0,8	Злакові попелиці	23	3,2	Екз/колос			2,3			3,2	5,0	100	0	0
2			Пшеничний трипс	13	2,3	Екз/колос			1,4			2,3	5,0	100	0	0
3	Ярий ячмінь	0,4	Злакові попелиці	13	0,6	Екз/рослину			1,0			0,6	2,0	100	0	0
4	Горох	0,04	Горохова трипс	76	2,6	Екз/рослину			2,0			2,6	3,0	100	0	0
5			Горохова попелиця	76	7,4	Екз/рослину			6,0			7,4	13,0	100	0	0
6			Горохова зернівка	14	1,3	Екз/рослину			1,0			1,3	2,0	100	0	0
7			Горохова плодожерка	10	0,4	Екз/рослину			1,0			0,4	1,0	100	0	0
8	Соя	0,5	Соєва попелиця	33	2,2	Екз/рослину			1,5			2,2	4,0	100	0	0
9			Чортополохівка	3	0,4	Екз/100 п.с.			0,3			0,4	1,0	100	0	0
10	Кукурудза	0,7	Злакові попелиці	23	3,7	Екз/рослину			2,5			3,7	8,0	100	0	0

11	Цукровий буряк	0,4	Бурякова мінуюча муха	23	2,9	Екз/рослину			3,0			2,9	6,0	100	0	0
12			Бурякова листкова попелиця	34	3,3	Екз/рослину			3,0			3,3	8,0	100	0	0
13	Соняшник	0,5	Геліхризова попелиця	34	4,5	Екз/рослину			5,0			4,5	8,0	100	0	0
14			Совка гамма	4	-	Екз/кв.м			0,2			0,3	1,0	100	0	0
15	Озимий ріпак	0,7	Ріпаковий насінневий прихованохоботник	19	5,6	Екз/рослину			1,0			5,6	7,0	100	0	0
16			Капустяна галиця	12	4,3	Екз/рослину			14,0			4,3	5,0	100	0	0
17	Картопля	0,003	Колорадський жук	67	9,0	Екз/рослину	1,0	1,0	4,5			9,0	17,0	100	0	0
18	Капуста	0,003	Білокрилка	33	9,0	Екз/рослину			22,0			9,0	22,0	100	0	0
19			Капустяна попелиця	17	4,8	Екз/рослину			10,0			4,8	9,0	100	0	0
20			Капустяна совка	13	1,7	Екз/рослину			3,0			1,7	4,0	100	0	0
21	Яблуня	0,03	Яблунева попелиця	42	42,0	Екз/дерево			7,0			2,4	5,0	100	0	0
22			Яблунева плодожерка	23	5,4	Екз/дерево						0,7	2,0	100	0	0

Інформація
щодо ураження хворобами сільськогосподарських рослин в Тернопільській області
станом на **26 червня 2025 року**

№ п/п	Назва культури	Обстежено, тис.га	Назва хвороби	У Р А Ж Е Н О, %						Розвиток хвороби, %	Загинуло рослин, %	
				Площ	Рослин		Назва ураженого органу	Органів рослин				
					Середній	Максимальний		середній	максимальн.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Озима пшениця	0,8	Борошниста роса	64	10,8	23,0	листя	6,1	12,0	3,0	-	
							стебло	11,4	23,0	5,7		
2				Септоріоз	3	0,3	1,0	листя	0,3	1,0	0,3	-
3				Піренофороз	15	5,4	12,0	листя	4,3	8,0	2,0	-
4				Бура іржа	7	2,9	6,0	листя	2,6	5,0	1,3	-
5				Фузаріоз колоса	4	0,6	2,0	колос	0,6	2,0	0,5	-
6	Ярий ячмінь	0,4	Гельмінтоспоріоз	46	10,2	21,0	листя	7,8	14,0	3,5	-	
7				Ринхоспоріоз	11	5,5	11,0	листя	3,8	8,0	2,0	-
8	Горох	0,04	Аскохітоз	76	8,1	15,0	листя	5,2	10,0	2,5	-	
9				Пероноспороз	40	4,3	8,0	листя	2,9	6,0	1,5	-
10	Соя	0,5	Аскохітоз	14	2,8	8,0	листя	1,6	3,0	0,8	-	
11	Соняшник	0,5	Пероноспороз	9	1,6	3,0	листя	0,6	2,0	0,5	-	
12	Цукровий буряк	0,4	Церкоспороз	8	0,4	2,0	листя	0,3	1,0	0,3	-	

13	Картопля	0,003	Фітофтороз	7	1,1	2,0	листя	0,5	1,0	0,3	-
14	Озимий ріпак	0,7	Альтернаріоз	15	4,3	8,0	стебло	4,3	8,0	2,0	-
							стручок	1,4	3,0	0,8	
15	Яблуня	0,03	Борошниста роса	65	16,8	31,0	листя	4,9	8,0	2,0	-
							пагони	1,8	4,0	1,0	
16			Парша	31	7,2	14,0	листя	2,3	5,0	1,3	-