

28.08.2025

Інформаційне повідомлення

щодо фітосанітарного стану агроценозів у Тернопільській області

Звітний тиждень на території Тернопільської області характеризувався прохолодною погодою подекуди з опадами, наприкінці тижня спостерігалось підвищення температури повітря.

Максимальна температура повітря вдень підвищувалася до +17...+24°C.

Мінімальна температура повітря вночі знижувалася до +9...+10°C.

Фенологія с/г культур

Кукурудза – воскова стиглість;

Соя – дозрівання;

Соняшник – дозрівання;

Цукровий буряк – пожовтіння нижніх листків;

Озимий ріпак – посів, проростання;

Картопля – засихання бадилля, збирання;

Багаторічні трави – початок дозрівання;

Сад – дозрівання плодів;

Фітосанітарний стан агроценозів

В стерні озимих зернових (пл. 0,3 тис.га) виявлено заселення 100% площі *мишоподібними гризунами*. Середня чисельність 2,4 жилих колоній/га, максимальна чисельність 3,0 жилих колоній/га (2,0-4,0 жилих нір/колонію).

В першій декаді вересня, при сухій погоді буде продовжуватися живлення гризунами рештками озимих зернових, проходитиме заселення просапних посівів, шкідливість зростатиме.

В посівах цукрових буряків проходить відродження та живлення гусениць *озимої совки* I-II віків, середня чисельність 0,3 екз/кв.м., максимальна 1,0 екз/кв.м., пошкодженість рослин становить 1,6% в слабкому ступені.

В першій декаді вересня в умовах теплої та вологої погоди буде проходити живлення гусениць озимої совки.

Інформація
щодо поширення і чисельності шкідників сільськогосподарських рослин в Тернопільській області
станом на **28 серпня 2025 року**

№ з/п	Назва культури	Обстежено, тис.га	Назва шкідника	Заселено, %		Чисельність, екз.						Пошкоджено (сисними-заселено) рослин, бруньок, листків, суцвіть, плодів, %		Ступінь пошкодження, %		
				площ	рослин (дерев)	одиниця виміру	іма-го	яйце	личинки		ентомо-фаги	середній	максимальний	слабкий (до 25% рослин)	середній (26-50% рослин)	сильний (51% і більше)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Кукурудза	0,9	Стебловий метелик	25	4,5	Екз/рослину			1,1	II-III		4,5	9,0	100	0	0
			Бавовникова совка	5	-	Екз/кв.м.			0,3			0,5 качан	2,0	100	0	0
2												1,6	3,0	100	0	0
3	Соя	0,6	Соєва попелиця	83	7,7	Екз/рослину			7,0		1,0	7,7	16,0	100	0	0
4			Бавовникова совка	10	-	Екз/кв.м.			0,3			1,2	3,0	100	0	0
5			Тютюновий трипс	14	4,2	Екз/рослину			3,0			4,2	9,0	100	0	0
6			Павутинний кліщ	11	2,4	Екз/рослину			2,0			2,4	5,0	100	0	0
7	Цукровий буряк	0,6	Бурякова мінуюча муха	11	1,9	Екз/рослину			2,0			1,9	4,0	100	0	0
8			Бурякова листкова попелиця	98	4,6	Екз/рослину			4,0		1,0	4,6	8,0	100	0	0
9	Соняшник	0,7	Бавовникова совка	10	-	Екз/кв.м.			0,3			0,9	3,0	100	0	0

10			Стебловий (кукурудзяний) метелик	11	1,3	Екз/ рослину			1,0	I-II		1,3	3,0	100	0	0
11	Яблуня	0,02	Яблунева плодожерка	100	42,6	% пошкоджених плодів						4,3	8,0	100	0	0

Інформація

щодо ураження хворобами сільськогосподарських рослин в Тернопільській області

станом на 28 серпня 2025 року

№ з/п	Назва культури	Обстежено, тис.га	Назва хвороби	У Р А Ж Е Н О, %						Розвиток хвороби, %	Загинуло рослин, %
				Площ	Рослин		Назва ураженого органу	Органів рослин			
					середній	максимальний		середній	максимальний		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Кукурудза	0,9	Бактеріоз початків	2	0,3	1,0	качан	0,3	1,0	-	-
2			Пухирчаста сажка	4	1,2	3,0	стебло	1,2	3,0	0,8	-
							качан	0,4	2,0	0,5	-
3			Фузаріоз початків	7	0,6	2,0	качан	0,4	2,0	0,5	-
4	Соя	0,6	Аскохітоз	83	11,3	22,0	листя	8,7	17,0	4,2	-
5			Септоріоз	27	4,3	8,0	листя	3,2	7,0	1,7	-
6			Пероноспороз	28	5,3	10,0	листя	3,8	8,0	2,0	-
7			Мозаїка сої	11	3,4	7,0	листя	2,6	5,0	-	-
8			Бактеріальний опік	8	2,6	5,0	листя	1,9	4,0	-	-
9	Соняшник	0,6	Фомоз	36	5,8	12,0	листя	4,6	9,0	2,3	-
10			Септоріоз	16	4,4	8,0	листя	3,3	7,0	1,8	-
11			Вертицильозне в'янення	4	1,2	3,0	листя	1,2	3,0	-	-
12			Сіра гниль	5	0,4	1,0	кошик	0,4	1,0	0,3	-

13			Біла гниль	5	0,7	2,0	кошик	0,7	2,0	-	-
14	Цукровий буряк	0,6	Церкоспороз	58	10,3	20,0	листя	7,6	14,0	3,5	-
15			Фомоз	23	3,2	7,0	листя	2,4	5,0	1,3	-
16			Рамуляріоз	12	3,8	8,0	листя	2,9	6,0	1,5	-
17			Вірусна жовтяниця	6	1,4	4,0	листя	1,1	3,0	-	-
18			Кореневі гнилі	8	0,7	2,0	корінь	0,6	2,0	-	-
19	Яблуня	0,02	Плодова гниль	65	8,9 дерев	18,0 дерев	плоди	2,4	5,0	-	-
20			Парша	100	37,6 дерев	54,0 дерев	листя	11,3	22,0	5,5	-
							плоди	3,6	8,0	2,0	