

04.09.2025

Оперативна інформація

щодо фітосанітарного стану агроценозів у Тернопільській області

Впродовж звітного тижня на території Тернопільської області була тепла погода, наприкінці тижня спостерігалось значне підвищення температури повітря.

Максимальна температура повітря вдень підвищувалася до +20...+30°C.

Мінімальна температура повітря вночі знижувалася до +14...+16°C.

Фенологія с/г культур

Кукурудза – воскова стиглість;

Соя – дозрівання;

Соняшник – дозрівання, побуріння
кошиків;

Цукровий буряк – пожовтіння нижніх
листіків;

Озимий ріпак – проростання, сходи;

Картопля – засихання бадилля,
збирання;

Багаторічні трави – початок дозрівання;

Сад – дозрівання плодів, збирання;

Фітосанітарний стан агроценозів

В стерні озимих зернових (пл. 0,3 тис.га) виявлено заселення 100% площі *мишоподібними гризунами*. Середня чисельність 2,3 жилих колоній/га, максимальна чисельність 3,0 жилих колоній/га (2,0-4,0 жилих нір/колонію).

В другій декаді вересня, при сухій погоді буде продовжуватися живлення гризунами рештками озимих зернових, проходитиме заселення просапних посівів, шкідливість зростатиме.

В посівах цукрових буряків проходить відродження та живлення гусениць *озимої совки* І-ІІ віків, середня чисельність 0,4 екз/кв.м., максимальна 1,0 екз/кв.м., пошкодженість рослин становить 2,1% в слабкому ступені.

В другій декаді вересня в умовах теплої та вологої погоди буде проходити живлення гусениць озимої совки.

У посівах озимого ріпаку (пл. 0,02 тис.га) відмічено літ *ріпакового пильщика*. Шкідником заселено 21% площі. Інтенсивність льоту становить 6,0 екз/100п.с.. Також проходить відкладання яєць, середня чисельність 1 шт/рослину, заселено кладками 0,7% рослин.

В другій декаді вересня в умовах теплої погоди буде продовжуватися літ, відкладання яєць, відродження та живлення гусениць ріпакового пильщика.

Інформація
щодо поширення і чисельності шкідників сільськогосподарських рослин в Тернопільській області
станом на **04 вересня 2025 року**

№ з/п	Назва культури	Обстежено, тис.га	Назва шкідника	Заселено, %		Чисельність, екз.						Пошкоджено (сисними-заселено) рослин, бруньок, листків, суцвіть, плодів, %		Ступінь пошкодження, %		
				площ	рослин (дерев)	одиниця виміру	іма-го	яйце	личинки		ентомо-фаги	середній	максимальний	слабкий (до 25% рослин)	середній (26-50% рослин)	сильний (51% і більше)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Кукурудза	0,7	Стебловий метелик	20	5,8	Екз/рослину			1,1	II-III		5,8	10,0	100	0	0
2			Бавовникова совка	8	-	Екз/кв.м.			0,3			0,9 качан	3,0	100	0	0
3			Злакові попелиці	20	8,2	Екз/рослину			10,0			8,2	10,0	100	0	0
4	Соя	0,5	Соєва попелиця	57	7,6	Екз/рослину			5,0		1,0	7,6	13,0	100	0	0
5			Бавовникова совка	8	-	Екз/кв.м.			0,3			1,6	3,0	100	0	0
6			Павутинний кліщ	16	2,1	Екз/рослину			2,5			2,1	6,0	100	0	0
7	Цукровий буряк	0,6	Бурякова мінуюча муха	11	2,4	Екз/рослину			2,0			2,4	5,0	100	0	0
8			Бурякова листкова попелиця	64	3,6	Екз/рослину			3,0		1,0	3,6	6,0	100	0	0
9	Соняшник	0,7	Стебловий (кукурудзяний) метелик	10	1,0	Екз/рослину			1,0	I-II		1,0	3,0	100	0	0

10	Озимий ріпак	0,2	Хрестоцвітні блішки	7	0,4	Екз/ кв.м.			1,0	I-II		0,4	1,0	100	0	0
11	Капуста	0,002	Капустяна совка	15	2,4	Екз/ кв.м.			0,3			2,4	5,0	100	0	0
12			Слимак сітчастий	10	3,6	Екз/ рослину			4,0			3,6	6,0	100	0	0
13	Яблуня	0,03	Яблунева плодожерка	65	49,2	% пошкоджених плодів						5,1	10,0	100	0	0

Інформація

щодо ураження хворобами сільськогосподарських рослин в Тернопільській області

станом на **04 вересня 2025 року**

№ з/п	Назва культури	Обстежено, тис.га	Назва хвороби	У Р А Ж Е Н О, %						Розвиток хвороби, %	Загинуло рослин, %
				Площ	Рослин		Назва ураженого органу	Органів рослин			
					середній	максимальний		середній	максимальний		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Кукурудза	0,7	Бактеріоз початків	2	0,4	2,0	качан	0,4	2,0	-	-
2			Пухирчаста сажка	5	1,4	3,0	стебло	1,4	3,0	0,8	-
							качан	0,5	2,0	0,5	-
3			Фузаріоз початків	5	0,9	2,0	качан	0,9	2,0	0,5	-
4			Альтернаріоз	12	5,7	10,0	листя	4,8	9,0	2,2	-
5			Гельмінтоспоріоз	16	10,1	18,0	листя	7,1	10,0	2,5	-
6			Оливкова пліснява	4	0,7	2,0	качан	0,7	2,0	0,5	-
7	Соя	0,5	Аскохітоз	100	10,0	24,0	листя	8,5	22,0	5,5	-
8			Септоріоз	31	3,9	10,0	листя	3,0	8,0	2,0	-
9			Пероноспороз	34	5,0	13,0	листя	3,6	10,0	2,5	-
10			Мозаїка сої	15	3,9	8,0	листя	3,1	6,0	-	-
11			Бактеріальний опік	12	3,2	6,0	листя	2,8	5,0	-	-

12	Соняшник	0,6	Фомоз	30	5,3	13,0	листя	4,1	10,0	2,5	-
13			Септоріоз	15	3,7	10,0	листя	3,0	8,0	2,0	-
14			Вертицильозне в'янення	4	1,4	3,0	листя	1,4	3,0	-	-
15			Пероноспороз	57	9,5	16,0	листя	6,2	13,0	-	-
16			Сіра гниль	3	0,7	2,0	кошик	0,7	2,0	0,5	-
17			Біла гниль	4	0,9	3,0	кошик	0,9	3,0	-	-
18	Цукровий буряк	0,6	Церкоспороз	43	9,1	22,0	листя	6,8	16,0	4,0	-
19			Фомоз	18	3,4	10,0	листя	2,8	8,0	2,0	-
20			Рамуляріоз	12	4,3	9,0	листя	3,6	7,0	1,7	-
21			Вірусна жовтяниця	6	2,1	4,0	листя	1,6	3,0	-	-
22			Кореневі гнилі	4	0,9	2,0	корінь	0,9	2,0	-	-
23			Борошниста роса	9	0,4	2,0	листя	0,3	1,0	0,3	-
24	Капуста	0,002	Судинний бактеріоз	10	1,5	3,0	листя	1,1	2,0	-	-
25			Слизовий бактеріоз	10	0,4	1,0	листя	0,2	1,0	-	-
26	Яблуня	0,03	Плодова гниль	46	9,3 дерев	19,0 дерев	плоди	3,8	7,0	-	-
27			Парша	65	42,7 дерев	58,0 дерев	листя	11,9	23,0	5,7	-
							плоди	4,1	19,0	4,7	