

11.09.2025

Інформаційне повідомлення

щодо фітосанітарного стану агроценозів у Тернопільській області

Звітний тиждень на території Тернопільської області характеризувався теплою погодою, наприкінці тижня спостерігалось опади у вигляді дощу з грозами.

Максимальна температура повітря вдень підвищувалася до +25...+31°C.

Мінімальна температура повітря вночі знижувалася до +12...+15°C.

Фенологія с/г культур

Кукурудза – воскова стиглість;

Соя – дозрівання;

Соняшник – дозрівання, побуріння
кошиків;

Цукровий буряк – пожовтіння нижніх
листіків;

Озимий ріпак – сходи, 3 листки;

Картопля – збирання;

Багаторічні трави – дозрівання;

Сад – дозрівання плодів, збирання;

Фітосанітарний стан агроценозів

В стерні озимих зернових (пл. 0,3 тис.га) виявлено заселення 63% площі *мишоподібними гризунами*. Середня чисельність 1,6 жилих колоній/га, максимальна чисельність 3,0 жилих колоній/га (2,0-4,0 жилих нір/колонію).

В другій декаді вересня, при сухій погоді буде продовжуватися живлення гризунами рештками озимих зернових, проходитиме заселення просапних посівів, шкідливість зростатиме.

В посівах цукрових буряків проходить відродження та живлення гусениць *озимої совки* I-II віків, середня чисельність 0,2 екз/кв.м., максимальна 1,0 екз/кв.м., пошкодженість рослин становить 0,3 % в слабкому ступені.

В другій декаді вересня в умовах теплої та вологої погоди буде проходити живлення гусениць озимої совки.

У посівах озимого ріпаку (пл. 0,1 тис.га) проходить відродження та живлення гусениць *озимої совки*, середня чисельність 0,2 екз/кв.м., максимальна 1,0 екз/кв.м., пошкодженість рослин становить 0,3 % в слабкому ступені.

В другій декаді вересня в умовах теплої погоди буде продовжуватися літ, відкладання яєць, відродження та живлення гусениць ріпакового пильщика.

На падалиці озимої пшениці (пл. 0,09 тис.га), відмічено відродження та живлення личинок *злакових мух*. Середня чисельність личинок становить 1,0 лич/кв.м., пошкодженість рослин становить 1,3 % в слабкому ступені. Також відмічено заселення 2,4% рослин *злаковими попелицями*.

Септоріозом уражено 100% падалиці озимої пшениці. Середня ураженість рослин становить 3,2%, максимально уражено 6,0%, розвиток хвороби становить 0,7%.

Бурою іржею пшениці уражено 13% обстеженої площі падалиці озимої пшениці. Середня ураженість рослин становить 0,8%, максимально уражено 2,0%, розвиток хвороби становить 0,3%.

В другій декаді вересня, за умов вологої погоди, хвороби будуть продовжувати розвиватися на рослинах падалиці озимої пшениці.

Інформація
щодо поширення і чисельності шкідників сільськогосподарських рослин в Тернопільській області
станом на 11 вересня 2025 року

№ з/п	Назва культури	Обстежено, тис.га	Назва шкідника	Заселено, %		Чисельність, екз.						Пошкоджено (сисними-заселено) рослин, бруньок, листків, суцвіть, плодів, %		Ступінь пошкодження, %		
				площ	рослин (дерев)	одиниця виміру	іма-го	яйце	личинки		енто-мо-фаги	середній	максима-льний	слаб-кий (до 25% рослин)	сере-дній (26-50% рослин)	силь-ний (51% і більше)
									екзем-плярів	вік						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Кукурудза	0,6	Стебловий метелик	42	5,5	Екз/рослину			1,1	II-III		5,5	11,0	100	0	0
												0,8 качан	3,0	100	0	0
2			Бавовникова совка	15	-	Екз/кв.м.			0,3			1,5	3,0	100	0	0
												1,2 качан	3,0	100	0	0
3	Соя	0,5	Соєва попелиця	44	7,6	Екз/рослину			6,0		1,0	7,6	15,0	100	0	0
4			Бавовникова совка	12	-	Екз/кв.м.			0,3			1,4	4,0	100	0	0
5			Павутинний кліщ	14	2,8	Екз/рослину			3,0			2,8	5,0	100	0	0
6	Цукровий буряк	0,6	Бурякова мінуюча муха	19	2,5	Екз/рослину			2,0			2,5	6,0	100	0	0
7			Бурякова листкова попелиця	63	4,5	Екз/рослину			4,0		1,0	4,5	8,0	100	0	0
8	Соняшник	0,6	Стебловий (кукурудзяний) метелик	7	1,3	Екз/рослину			1,0	I-II		1,3	3,0	100	0	0
9			Бавовникова совка	4	-	Екз/кв.м.			0,3			0,9	3,0	100	0	0

10	Озимий ріпак	0,2	Хрестоцвітні блішки	22	-	Екз/ кв.м.	1,0					0,7	3,0	100	0	0
11			Ріпаковий пмльщик	6	-	Екз/ кв.м.			0,2			0,4	2,0	100	0	0
12	Яблуня	0,02	Яблунева плодожерка	100	54,6	% пошкоджених плодів						5,4	11,0	100	0	0

Інформація
 щодо ураження хворобами сільськогосподарських рослин в Тернопільській області
 станом на **11 вересня 2025 року**

№ з/п	Назва культури	Обстежено, тис.га	Назва хвороби	У Р А Ж Е Н О, %						Розвиток хвороби, %	Загинуло рослин, %
				Площ	Рослин		Назва ураженого органу	Органів рослин			
					середній	максимальний		середній	максимальний		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Кукурудза	0,6	Бактеріоз початків	2	0,5	1,0	качан	0,5	1,0	-	-
2			Пухирчаста сажка	6	1,7	4,0	стебло	1,7	4,0	1,0	-
							качан	0,5	2,0	0,5	-
3			Фузаріоз початків	8	1,2	3,0	качан	1,2	3,0	0,8	-
4			Альтернаріоз	13	6,1	12,0	листя	5,3	10,0	2,5	-
5			Оливкова пліснява	4	0,8	2,0	качан	0,8	2,0	0,5	-
6	Соя	0,5	Аскохітоз	82	12,2	26,0	листя	9,5	23,0	5,7	-
7			Септоріоз	32	4,7	11,0	листя	3,8	9,0	2,2	-
8			Пероноспороз	38	5,8	13,0	листя	4,3	11,0	2,7	-
9			Мозаїка сої	11	3,4	7,0	листя	2,6	5,0	-	-
10			Бактеріальний опік	11	3,6	7,0	листя	2,9	6,0	-	-
11			Жовта мозаїка	14	4,3	9,0	листя	3,6	7,0	-	-
12	Соняшник	0,6	Фомоз	45	5,9	12,0	листя	4,6	9,0	2,2	-

13			Септоріоз	10	4,5	8,0	листя	3,4	7,0	1,8	-
14			Вертицильозне в'янення	6	1,6	4,0	листя	1,6	4,0	-	-
15			Сіра гниль	9	0,9	3,0	кошик	0,9	3,0	0,8	-
16			Біла гниль	9	0,9	3,0	кошик	0,8	3,0	-	-
17	Цукровий буряк	0,6	Церкоспороз	99	11,7	24,0	листя	9,0	19,0	4,8	-
18			Фомоз	24	4,2	110,	листя	3,3	8,0	2,0	-
19			Рамуляріоз	13	4,8	10,0	листя	3,9	8,0	2,0	-
20			Вірусна жовтяниця	13	2,0	5,0	листя	1,5	4,0	-	-
21			Кореневі гнилі	8	0,9	3,0	корінь	0,7	3,0	-	-
22			Борошниста роса	2	0,6	2,0	листя	0,4	1,0	0,3	-
23			Парша звичайна	6	1,4	3,0	корінь	1,4	3,0	0,8	-
24	Озимий ріпак	0,2	Чорна ніжка	3	0,2	1,0	листя	0,2	1,0	-	-
25	Яблуня	0,02	Плодова гниль	71	9,8 дерев	20,0 дерев	плоди	4,3	8,0	-	-
26			Парша	100	47,3 дерев	64,0 дерев	листя	12,4	25,0	6,2	-
							плоди	4,6	10,0	2,5	