

18.09.2025

Оперативна інформація

щодо фітосанітарного стану агроценозів у Тернопільській області

Впродовж звітного тижня на території Тернопільської області спостерігалось зниження температури повітря, проходили опади у виді дощу, грози.

Максимальна температура повітря вдень підвищувалася до +16...+18°C.

Мінімальна температура повітря вночі знижувалася до +8...+10°C.

Фенологія с/г культур

Озима пшениця – посів;

Кукурудза – повна стиглість;

Соя – повна стиглість, збирання;

Соняшник – збирання;

Цукровий буряк – пожовтіння нижніх листків;

Озимий ріпак – утворення листової розетки;

Картопля – збирання;

Багаторічні трави – відростання;

Сад – збирання.

Фітосанітарний стан агроценозів

В стерні озимих зернових (пл. 0,2 тис.га) виявлено заселення 100% площі *мишоподібними гризунами*. Середня чисельність 2,4 жилих колоній/га, максимальна чисельність 3,0 жилих колоній/га (2,0-4,0 жилих нір/колонію).

В посівах озимого ріпаку (пл. 0,12 тис.га) заселено 10% обстежених посівів, при середній чисельності 1,1 жилих колоній/га, максимальній – 2,0 жилих колоній/га (2,0-3,0 жилих нір/колонію).

В третій декаді вересня, при сухій погоді буде продовжуватися заселення гризунами посівів озимого ріпаку.

У посівах озимого ріпаку проходить відродження та живлення гусениць *озимої совки*, середня чисельність 0,2 екз/кв.м., максимальна 1,0 екз/кв.м., пошкодженість рослин становить 0,4% в слабкому ступені.

В третій декаді вересня в умовах теплої погоди буде проходити живлення гусениць, шкодочинність зростатиме.

Проведено аналіз бульб картоплі сорту Слов'янка в дрібних селянських господарствах (партія 50 центнерів), виявлено ураження: парша звичайна – 2,4%; ризоктоніоз – 1,8%; мокра гниль – 0,2%; суха гниль – 0,4%; фітофтороз – 1,6%; чорна ніжка – 0,2%; сіра плямистість – 0,2%.

Інформація
щодо поширення і чисельності шкідників сільськогосподарських рослин в Тернопільській області
станом на **18 вересня 2025 року**

№ з/п	Назва культури	Обстежено, тис.га	Назва шкідника	Заселено, %		Чисельність, екз.						Пошкоджено (сисними-заселено) рослин, бруньок, листків, суцвіть, плодів, %		Ступінь пошкодження, %		
				площ	рослин (дерев)	одиниця виміру	іма-го	яйце	личинки		енто-мо-фаги	середній	максима-льний	слаб-кий (до 25% рослин)	сере-дній (26-50% рослин)	силь-ний (51% і більше)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Кукурудза	0,9	Стебловий (кукурудзяний) метелик	50	6,6	Екз/ рослину			1,0	II-III		6,6	12,0	100	0	0
												1,5 качан	4,0	100	0	0
2	Цукровий буряк	0,4	Бурякова мінуюча муха	35	3,4	Екз/ рослину			2,0			3,4	5,0	100	0	0
3	Озимий ріпак	0,6	Ріпаковий пильщик	12	-	Екз/ кв.м.			1,0			0,5	2,0	100	0	0
4			Ріпаковий білан	9	0,3	Екз/ рослину			0,2			0,3	1,0	100	0	0
5	Яблуня	0,02	Яблунева плодожерка	100	61,4	% пошкоджених плодів						5,7	12,0	100	0	0

Інформація

щодо ураження хворобами сільськогосподарських рослин в Тернопільській області

станом на 18 вересня 2025 року

№ з/п	Назва культури	Обстежено, тис.га	Назва хвороби	У Р А Ж Е Н О, %						Розвиток хвороби, %	Загинуло рослин, %
				Площ	Рослин		Назва ураженого органу	Органів рослин			
					середній	максимальний		середній	максимальний		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Кукурудза	0,9	Бактеріоз початків	4	0,6	2,0	качан	0,6	2,0	-	-
2			Пухирчаста сажка	10	1,8	4,0	стебло	1,8	4,0	1,0	-
3							качан	0,7	2,0	0,5	-
4			Фузаріоз початків	23	1,7	4,0	качан	1,7	4,0	1,0	-
5	Соя	0,3	Оливкова пліснява	12	0,8	3,0	качан	0,8	3,0	0,8	-
6			Аскохітоз	18	5,2	9,0	стручки	1,2	3,0	0,8	-
7	Соняшник	0,7	Фузаріоз	4	1,1	3,0	стручки	0,4	1,0	0,3	-
8			Сіра гниль	19	1,8	4,0	кошик	1,8	4,0	1,0	-
9	Цукровий буряк	0,4	Біла гниль	18	1,4	3,0	кошик	1,4	3,0	-	-
10			Церкоспороз	100	13,2	26,0	листя	13,2	26,0	6,5	-
11			Фомоз	43	5,8	12,0	листя	5,8	12,0	3,0	-
12			Пероноспороз	8	0,6	2,0	листя	0,6	2,0	0,5	-
			Вірусна жовтяниця	25	3,1	6,0	листя	3,1	6,0	-	-

13			Кореневі гнилі	19	1,4	3,0	корінь	1,4	3,0	-	-
14			Борошниста роса	12	0,9	3,0	листя	0,9	3,0	0,8	-
15			Парша звичайна	11	1,8	4,0	корінь	1,8	4,0	1,0	-
16	Озимий ріпак	0,6	Пероноспороз	11	0,9	2,0	листя	0,9	2,0	0,5	
17	Яблуня	0,02	Плодова гниль	71	10,7 дерев	22,0 дерев	плоди	4,7	10,0	-	-
18			Парша	100	51,3 дерев	70,0 дерев	листя	13,8	27,0	6,8	-
							плоди	5,1	12,0	3,0	