

25.09.2025

Інформаційне повідомлення

щодо фітосанітарного стану агроценозів у Тернопільській області

Звітний тиждень на території Тернопільської області характеризувався мінливою погодою, на зміну теплим і сонячним дням прийшли холодні із опадами.

Максимальна температура повітря в найтепліші дні (19-20 вересня) підвищувалася до +28,5°C, після 23 вересня - до +12...+14°C

Мінімальна температура повітря вночі знижувалася до +6°C.

Погодні умови були сприятливими для завершення вегетації пізніх с/г культур. Наприкінці другої декади вересня, після випадання опадів, господарства області розпочали сівбу озимих культур.

Фенологія с/г культур

Озима пшениця – посів, проростання;

Кукурудза – повна стиглість;

Соя – збирання;

Соняшник – збирання;

Цукровий буряк – пожовтіння нижніх листків;

Озимий ріпак – утворення листової розетки;

Картопля – збирання;

Багаторічні трави – відростання;

Сад – збирання.

Фітосанітарний стан агроценозів

В стерні озимих зернових (пл. 0,2 тис.га) виявлено заселення 100% площі ***мишоподібними гризунами***. Середня чисельність 2,3 жилих колоній/га, максимальна чисельність 3,0 жилих колоній/га (2,0-4,0 жилих нір/колонію).

В посівах озимого ріпаку (пл. 0,2 тис.га) виявлено заселення 18% площі ***мишоподібними гризунами***. Середня чисельність 1,1 жилих колоній/га, максимальна чисельність 2,0 жилих колоній/га (2,0-3,0 жилих нір/колонію).

У посівах озимого ріпаку проходить живлення гусениць ***озимої совки***, середня чисельність 0,2 екз/кв.м., максимальна 1,0 екз/кв.м., пошкодженість рослин становить 0,5 % в слабкому ступені.

Інформація
щодо поширення і чисельності шкідників сільськогосподарських рослин в Тернопільській області
станом на 25 вересня 2025 року

№ з/п	Назва культури	Обстежено, тис.га	Назва шкідника	Заселено, %		Чисельність, екз.						Пошкоджено (сисними-заселено) рослин, бруньок, листків, суцвіть, плодів, %		Ступінь пошкодження, %		
				площ	рослин (дерев)	одиниця виміру	іма-го	яйце	личинки		енто-мо-фаги	середній	максима-льний	слаб-кий (до 25% рослин)	сере-дній (26-50% рослин)	силь-ний (51% і більше)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Кукурудза	0,64	Стебловий (кукурудзяний) метелик	25	6,7	Екз/ рослину			1,0	II-III		6,7	10,0	100	0	0
												1,4 качан	3,0	100	0	0
2	Цукровий буряк	0,4	Бурякова мінуюча муха	37	3,8	Екз/ рослину			2,0			3,8	8,0	100	0	0
3	Озимий ріпак	0,42	Ріпаковий пильщик	20	-	Екз/ кв.м.			1,0			0,7	3,0	100	0	0
4			Ріпаковий білан	13	0,4	Екз/ рослину			1,0			0,4	1,0	100	0	0

Інформація
щодо ураження хворобами сільськогосподарських рослин в Тернопільській області
станом на **25 вересня 2025 року**

№ з/п	Назва культури	Обстежено, тис.га	Назва хвороби	У Р А Ж Е Н О, %						Розвиток хвороби, %	Загинуло рослин, %
				Площ	Рослин		Назва ураженого органу	Органів рослин			
					середній	максимальний		середній	максимальний		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Кукурудза	0,64	Бактеріоз початків	5	0,9	2,0	качан	0,9	2,0	-	-
2			Пухирчаста сажка	6	1,9	4,0	стебло	1,9	4,0	1,0	-
							качан	0,9	3,0	0,8	-
3			Фузаріоз початків	35	1,8	5,0	качан	1,8	5,0	1,3	-
4	Соняшник	0,42	Біла гниль	15	1,2	3,0	кошик	1,2	3,0	-	-
5	Цукровий буряк	0,4	Церкоспороз	100	14,2	28,0	листя	14,2	28,0	7,0	-
6			Фомоз	45	6,2	14,0	листя	6,2	14,0	3,5	-
7			Пероноспороз	810	0,7	3,0	листя	0,7	3,0	0,8	-
8			Вірусна жовтяниця	15	3,8	7,0	листя	3,8	7,0	-	-
9			Кореневі гнилі	8	1,6	3,0	корінь	1,6	3,0	-	-
10			Борошниста роса	14	1,0	3,0	листя	1,0	3,0	0,8	-
11			Парша звичайна	12	2,1	5,0	корінь	2,1	5,0	1,3	-
12	Озимий ріпак	0,42	Пероноспороз	16	1,0	3,0	листя	1,0	3,0	0,8	-
13			Альтернаріоз	4	0,4	1,0	листя	0,4	1,0	0,3	-