

02.10.2025

Оперативна інформація

щодо фітосанітарного стану агроценозів у Тернопільській області

Звітний тиждень на території Тернопільської області характеризувався прохолодною та вітряною погодою, наприкінці тижня спостерігалися опади у вигляді дощу.

Максимальна температура повітря підвищувалася до +8...+13°C

Мінімальна температура повітря вночі знижувалася до +2°C.

Фенологія с/г культур

Озима пшениця – проростання – сходи;

Кукурудза – повна стиглість;

Соя – збирання;

Соняшник – збирання;

Цукровий буряк – пожовтіння нижніх листків, збирання;

Озимий ріпак – утворення листової розетки;

Картопля – збирання;

Багаторічні трави – відростання;

Сад – збирання.

Фітосанітарний стан агроценозів

В стерні озимих зернових (пл. 0,2 тис.га) виявлено заселення 100% площі ***мишоподібними гризунами***. Середня чисельність 2,3 жилих колоній/га, максимальна чисельність 3,0 жилих колоній/га (2,0-4,0 жилих нір/колонію).

В посівах озимого ріпаку (пл. 0,4 тис.га) виявлено заселення 24% площі ***мишоподібними гризунами***. Середня чисельність 0,2 жилих колоній/га, максимальна чисельність 1,0 жилих колоній/га (2,0-3,0 жилих нір/колонію).

У посівах озимого ріпаку проходить живлення гусениць ***озимої совки***, середня чисельність 0,2 екз/кв.м., максимальна 1,0 екз/кв.м., пошкодженість рослин становить 0,5 % в слабкому ступені.

Інформація
щодо поширення і чисельності шкідників сільськогосподарських рослин в Тернопільській області
станом на 02 жовтня 2025 року

№ з/п	Назва культури	Обстежено, тис.га	Назва шкідника	Заселено, %		Чисельність, екз.						Пошкоджено (сисними-заселено) рослин, бруньок, листків, суцвіть, плодів, %		Ступінь пошкодження, %		
				площ	рослин (дерев)	одиниця виміру	іма-го	яйце	личинки		ентомо-фаги	середній	максимальний	слабкий (до 25% рослин)	середній (26-50% рослин)	сильний (51% і більше)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Озима пшениця	0,4	Злакові попелиці	6	0,3	Екз/рослину			1,0			0,3	1,0	100	0	0
2			Злакові цикадки	10	-	Екз/кв.м	4,0					0,5	2,0	100	0	0
3	Озимий ріпак	0,4	Ріпаковий пильщик	21	-	Екз/кв.м.			1,0			0,9	3,0	100	0	0
4			Ріпаковий білан	9	0,5	Екз/рослину			0,6			0,5	2,0	100	0	0

Інформація
щодо ураження хворобами сільськогосподарських рослин в Тернопільській області
станом на **02 жовтня 2025 року**

№ з/п	Назва культури	Обстежено, тис.га	Назва хвороби	У Р А Ж Е Н О, %						Розвиток хвороби, %	Загинуло рослин, %
				Площ	Рослин		Назва ураженого органу	Органів рослин			
					середній	максимальний		середній	максимальний		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Кукурудза	0,5	Бактеріоз початків	20	2,7	8,0	качан	1,2	3,0	-	-
2			Оливкова пліснява	35	1,7	4,0	качан	1,7	4,0	1,0	-
3			Фузаріоз початків	23	3,2	7,0	качан	3,2	7,0	1,7	-
4	Цукровий буряк	0,4	Кореневі гнилі	14	1,5	4,0	корінь	1,5	4,0	-	-
5			Парша звичайна	22	2,0	5,0	корінь	2,0	5,0	1,2	-
6			Парша пояскова	3	0,7	2,0	корінь	0,7	2,0	0,5	-
7			Некроз судин	6	0,6	2,0	корінь	0,6	2,0	0,5	-
8			Дуплистість	7	0,8	2,0	корінь	0,8	2,0	0,5	-
9	Озимий ріпак	0,6	Пероноспороз	16	2,2	7,0	листя	0,8	2,0	0,5	-
10			Альтернаріоз	8	0,7	2,0	листя	0,4	1,0	0,3	-