

16.10.2025

Оперативна інформація

щодо фітосанітарного стану агроценозів у Тернопільській області

Впродовж звітного тижня на території Тернопільської області була прохолодна проте сонячна погода, в окремі дні були опади у вигляді дощу.

Максимальна температура повітря вдень підвищувалася до +9...+12°C.

Мінімальна температура повітря вночі знижувалася до +2...+5°C.

Понижений температурний режим та часті опади, які збільшували вологозапаси ґрунту, сприяли проростанню зерна та початковому росту озимини.

Водночас такі погодні умови стримували збір урожаю пізніх культур. Станом на 09.10 господарства області продовжують збір овочів (90%), цукрових буряків (44%), сої (74%), соняшнику (61%) та кукурудзи (9%). Сівбу озимих зернових завершено.

За експертною оцінкою наших агрометеорологів на півдні області на посівах соняшнику, через часті опади, спостерігається загнивання зворотного боку кошика у 10-20% рослин.

Фенологія с/г культур

Озима пшениця – три листки;

Кукурудза – збирання;

Озимий ріпак – утворення листової розетки;

Багаторічні трави – відростання.

Фітосанітарний стан агроценозів

Фітосанітарним моніторингом посівів озимої пшениці (пл. 0,3 тис.га), озимого ріпаку (пл. 0,4 тис.га) та багаторічних трав (пл. 0,02 тис.га) виявлено, що чисельність **мишоподібних гризунів** становить:

- в посівах озимих зернових культур заселено 33% посівів, при середній чисельності 1,0 жилих колоній/га, максимальній 2,0 жилих колоній/га (2,0-3,0 жилих нір/колонію);
- в посівах озимого ріпаку заселено 42% посівів, при середній чисельності 1,3 жилих колоній/га, максимальній – 3,0 жилих колоній/га (3,0-4,0 жилих нір/колонію);
- в посівах багаторічних трав заселено 100% посівів, при середній чисельності 2,7 жилих колоній/га, максимальній – 4,0 жилих колоній/га (3,0-5,0 жилих нір/колонію);

В третій декаді жовтня буде продовжуватися заселення гризунами посівів озимих зернових, озимого ріпаку та багаторічних трав, шкідливість зростатиме.

Інформація
щодо поширення і чисельності шкідників сільськогосподарських рослин в Тернопільській області
станом на **16 жовтня 2025 року**

№ з/п	Назва культури	Обстежено, тис.га	Назва шкідника	Заселено, %		Чисельність, екз.					Пошкоджено (сисними-заселено) рослин, бруньок, листків, суцвіть, плодів, %		Ступінь пошкодження, %			
				площ	рослин (дерев)	одиниця виміру	іма-го	яйце	личинки		ентомо-фаги	середній	максимальний	слабкий (до 25% рослин)	середній (26-50% рослин)	сильний (51% і більше)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Озима пшениця	0,6	Злакові попелиці	51	0,4	Екз/рослину			1,0			0,4	1,0	100	0	0

Інформація
щодо ураження хворобами сільськогосподарських рослин в Тернопільській області
станом на **16 жовтня 2025 року**

№ з/п	Назва культури	Обстежено, тис.га	Назва хвороби	У Р А Ж Е Н О, %						Розвиток хвороби, %	Загинуло рослин, %
				Площ	Рослин		Назва ураженого органу	Органів рослин			
					середній	максимальний		середній	максимальний		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Озима пшениця	0,6	Септоріоз	4	0,4	1,0	листя	0,2	1,0	0,3	-
2			Борошниста роса	3	0,6	2,0	листя	0,3	1,0	0,3	-
3			Кореневі гнилі	3	0,3	1,0	корінь	0,3	1,0	-	-
4	Озимий ріпак	0,7	Пероноспороз	12	2,4	7,0	листя	0,9	3,0	0,8	-
5			Альтернаріоз	7	0,8	3,0	листя	0,5	2,0	0,5	-
6			Циліндроспоріоз	3	0,6	2,0	листя	0,4	1,0	0,3	-