

23.10.2025

Інформаційне повідомлення

щодо фітосанітарного стану агроценозів у Тернопільській області

Звітний тиждень на території Тернопільської області характеризувався холодною та вітряною погодою, температурний режим виявився нижчим кліматичної норми. Спостерігалися заморозки в повітрі та на ґрунті. Кількість опадів була значно меншою декадної норми. На початку третьої декади жовтня спостерігалось невелике підвищення температури.

Максимальна температура повітря вдень підвищувалася до +8...+13°C.

Мінімальна температура повітря знижувалась до 3-9° тепла, а в останній день другої декади - до 1-4° морозу.

Фенологія с/г культур

Озима пшениця – три листки;
Кукурудза – збирання;

Озимий ріпак – утворення листової розетки;
Багаторічні трави – відростання.

Фітосанітарний стан агроценозів

Фітосанітарним моніторингом посівів озимої пшениці (пл. 0,3 тис.га), озимого ріпаку (пл. 0,3 тис.га) та багаторічних трав (пл. 0,02 тис.га) виявлено, що чисельність **мишоподібних гризунів** становить:

- в посівах озимих зернових культур заселено 37% посівів, при середній чисельності 1,1 жилих колоній/га, максимальній 2,0 жилих колоній/га (2,0-3,0 жилих нр/колонію);
- в посівах озимого ріпаку заселено 50% посівів, при середній чисельності 1,4 жилих колоній/га, максимальній – 3,0 жилих колоній/га (3,0-4,0 жилих нр/колонію);
- в посівах багаторічних трав заселено 100% посівів, при середній чисельності 2,8 жилих колоній/га, максимальній – 5,0 жилих колоній/га (3,0-5,0 жилих нр/колонію);

В третій декаді жовтня буде продовжуватися заселення гризунами посівів озимих зернових, озимого ріпаку та багаторічних трав, шкідливість зростатиме.

Інформація
щодо поширення і чисельності шкідників сільськогосподарських рослин в Тернопільській області
станом на **23 жовтня 2025 року**

№ з/п	Назва культури	Обстежено, тис.га	Назва шкідника	Заселено, %		Чисельність, екз.					Пошкоджено (сисними-заселено) рослин, бруньок, листків, суцвіть, плодів, %		Ступінь пошкодження, %			
				площ	рослин (дерев)	одиниця виміру	іма-го	яйце	личинки		ентомо-фаги	середній	максимальний	слабкий (до 25% рослин)	середній (26-50% рослин)	сильний (51% і більше)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Озима пшениця	0,4	Злакові попелиці	10	0,5	Екз/рослину			1,0			0,5	2,0	100	0	0

Інформація
щодо ураження хворобами сільськогосподарських рослин в Тернопільській області
станом на **23 жовтня 2025 року**

№ з/п	Назва культури	Обстежено, тис.га	Назва хвороби	У Р А Ж Е Н О, %						Розвиток хвороби, %	Загинуло рослин, %
				Площ	Рослин		Назва ураженого органу	Органів рослин			
					середній	максимальний		середній	максимальний		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Озима пшениця	0,4	Септоріоз	6	0,5	2,0	листя	0,3	1,0	0,3	-
2			Борошниста роса	7	0,9	3,0	листя	0,4	1,0	0,3	-
3			Кореневі гнилі	5	0,3	1,0	корінь	0,3	1,0	-	-
4	Озимий ріпак	0,4	Пероноспороз	21	2,5	6,0	листя	0,9	3,0	0,8	-
5			Альтернаріоз	711	0,8	3,0	листя	0,6	2,0	0,5	-
6			Циліндроспоріоз	5	0,8	3,0	листя	0,5	2,0	0,5	-