

06.11.2025

Інформаційне повідомлення

щодо фітосанітарного стану агроценозів у Тернопільській області

Звітний тиждень на території Тернопільської області характеризувався прохолодною, проте сонячною погодою, без опадів.

Максимальна температура повітря вдень підвищувалася до +8...+12°C.

Мінімальна температура повітря вночі знижувалася до +4...+6°C.

Фенологія с/г культур

Озима пшениця – три листки;

Багаторічні трави – відростання.

Озимий ріпак – утворення розетки;

Фітосанітарний стан агроценозів

Фітосанітарним моніторингом посівів озимої пшениці (пл. 0,4 тис.га) та озимого ріпаку (пл. 0,3 тис.га) виявлено, що чисельність **мишоподібних гризунів** становить:

- в посівах озимих зернових культур заселено 47% посівів, при середній чисельності 1,2 жилих колоній/га, максимальній 2,0 жилих колоній/га (2,0-3,0 жилих нір/колонію);
- в посівах озимого ріпаку заселено 59% посівів, при середній чисельності 1,6 жилих колоній/га, максимальній – 3,0 жилих колоній/га (3,0-4,0 жилих нір/колонію);

В другій декаді листопада буде продовжуватися заселення гризунами посівів озимих зернових, озимого ріпаку та багаторічних трав, шкідливість зростатиме.

Інформація
 щодо поширення і чисельності шкідників сільськогосподарських рослин в Тернопільській області
 станом на **06 листопада 2025 року**

№ з/п	Назва культури	Обстежено, тис.га	Назва шкідника	Заселено, %		Чисельність, екз.						Пошкоджено (сисними-заселено) рослин, бруньок, листків, суцвіть, плодів, %		Ступінь пошкодження, %		
				площ	рослин (дерев)	одиниця виміру	іма-го	яйце	личинки		ентомо-фаги	середній	максимальний	слабкий (до 25% рослин)	середній (26-50% рослин)	сильний (51% і більше)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Озима пшениця	0,5	Злакові попелиці	13	0,7	Екз/рослину			1,0			0,7	3,0	100	0	0

Інформація
 щодо ураження хворобами сільськогосподарських рослин в Тернопільській області
 станом на **06 листопада 2025 року**

№ з/п	Назва культури	Обстежено, тис.га	Назва хвороби	У Р А Ж Е Н О, %						Розвиток хвороби, %	Загинуло рослин, %
				Площ	Рослин		Назва ураженого органу	Органів рослин			
					середній	максимальний		середній	максимальний		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Озима пшениця	0,5	Септоріоз	10	0,8	3,0	листя	0,4	2,0	0,5	-
2			Борошниста роса	11	1,3	3,0	листя	0,7	2,0	0,5	-
3			Кореневі гнилі	6	0,5	2,0	корінь	0,5	2,0	-	-
4	Озимий ріпак	0,4	Пероноспороз	23	2,7	7,0	листя	1,1	3,0	0,8	-
5			Циліндроспоріоз	7	1,2	3,0	листя	0,7	2,0	0,5	-