

13.11.2025

Оперативна інформація

щодо фітосанітарного стану агроценозів у Тернопільській області

Звітний тиждень на території Тернопільської області характеризувався прохолодною, проте сонячною погодою, наприкінці тижня спостерігалися невеликі опади, у вигляді дощу.

Максимальна температура повітря вдень підвищувалася до +8...+13°C.

Мінімальна температура повітря вночі знижувалася до +5...+6°C.

Фенологія с/г культур

Озима пшениця – початок куцання; Багаторічні трави – відростання.
Озимий ріпак – утворення розетки;

Фітосанітарний стан агроценозів

Фітосанітарним моніторингом посівів озимої пшениці (пл. 0,3 тис.га), озимого ріпаку (пл. 0,3 тис.га) там багаторічних трав (пл. 0,02 тис.га) виявлено, що чисельність **мишоподібних гризунів** становить:

- в посівах озимих зернових культур заселено 60% посівів, при середній чисельності 1,7 жилих колоній/га, максимальній 3,0 жилих колоній/га (3,0-4,0 жилих нір/колонію);
- в посівах озимого ріпаку заселено 65% посівів, при середній чисельності 1,7 жилих колоній/га, максимальній – 3,0 жилих колоній/га (3,0-4,0 жилих нір/колонію);
- в посівах багаторічних трав заселено 100% посівів, при середній чисельності 2,9 жилих колоній/га, максимальній – 5,0 жилих колоній/га (3,0-5,0 жилих нір/колонію);

В другій декаді листопада буде продовжуватися заселення гризунами посівів озимих зернових, озимого ріпаку та багаторічних трав, шкідливість зростатиме.

Інформація
 щодо поширення і чисельності шкідників сільськогосподарських рослин в Тернопільській області
 станом на **13 листопада 2025 року**

№ з/п	Назва культури	Обстежено, тис.га	Назва шкідника	Заселено, %		Чисельність, екз.						Пошкоджено (сисними-заселено) рослин, бруньок, листків, суцвіть, плодів, %		Ступінь пошкодження, %		
				площ	рослин (дерев)	одиниця виміру	іма-го	яйце	личинки		ентомо-фаги	середній	максимальний	слабкий (до 25% рослин)	середній (26-50% рослин)	сильний (51% і більше)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Озима пшениця	0,4	Злакові попелиці	2	0,2	Екз/рослину			1,0			0,2	1,0	100	0	0

Інформація
 щодо ураження хворобами сільськогосподарських рослин в Тернопільській області
 станом на **13 листопада 2025 року**

№ з/п	Назва культури	Обстежено, тис.га	Назва хвороби	У Р А Ж Е Н О, %						Розвиток хвороби, %	Загинуло рослин, %
				Площ	Рослин		Назва ураженого органу	Органів рослин			
					середній	максимальний		середній	максимальний		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Озима пшениця	0,4	Септоріоз	11	0,9	3,0	листя	0,5	2,0	0,5	-
2			Борошниста роса	10	1,6	4,0	листя	0,9	2,0	0,5	-
3			Кореневі гнилі	7	0,5	2,0	корінь	0,5	2,0	-	-
4			Бура іржа	3	0,4	1,0	листя	0,8	2,0	0,5	-
5	Озимий ріпак	0,4	Пероноспороз	25	2,9	7,0	листя	1,1	3,0	0,8	-