

20.11.2025

Інформаційне повідомлення

щодо фітосанітарного стану агроценозів у Тернопільській області

Впродовж звітного тижня на території Тернопільської області була прохолодна погода, в окремі дні були опади у вигляді дощу з снігом, наприкінці тижня спостерігалися невеликі заморозки.

Максимальна температура повітря вдень підвищувалася до +8...+12°C.

Мінімальна температура повітря вночі знижувалася до -...-4°C.

Фенологія с/г культур

Озима пшениця – початок кущення; Багаторічні трави – відростання.
Озимий ріпак – утворення розетки;

Фітосанітарний стан агроценозів

Фітосанітарним моніторингом посівів озимої пшениці (пл. 0,3 тис.га) та озимого ріпаку (пл. 0,4 тис.га) виявлено, що чисельність **мишоподібних гризунів** становить:

- в посівах озимих зернових культур заселено 60% посівів, при середній чисельності 1,5 жилих колоній/га, максимальній 3,0 жилих колоній/га (3,0-4,0 жилих нір/колонію);
- в посівах озимого ріпаку заселено 65% посівів, при середній чисельності 1,8 жилих колоній/га, максимальній – 3,0 жилих колоній/га (3,0-4,0 жилих нір/колонію);

В третій декаді листопада буде продовжуватися заселення гризунами посівів озимих зернових та озимого ріпаку, шкідливість зростатиме.

Інформація
щодо ураження хворобами сільськогосподарських рослин в Тернопільській області
станом на **20 листопада 2025 року**

№ з/п	Назва культури	Обстежено, тис.га	Назва хвороби	У Р А Ж Е Н О, %						Розвиток хвороби, %	Загинуло рослин, %
				Площ	Рослин		Назва ураженого органу	Органів рослин			
					середній	максимальний		середній	максимальний		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Озима пшениця	0,4	Септоріоз	14	0,9	3,0	листя	0,5	2,0	0,5	-
2			Борошниста роса	22	1,5	4,0	листя	1,0	3,0	0,8	-
3			Кореневі гнилі	10	0,7	2,0	корінь	0,6	2,0	-	-
4			Бура іржа	8	0,4	1,0	листя	0,4	1,0	0,3	-
5	Озимий ріпак	0,4	Пероноспороз	30	2,5	5,0	листя	1,7	3,0	0,8	-