

27.11.2025

Оперативна інформація

про стан розвитку та розповсюдження основних шкідників і хвороб
сільськогосподарських рослин у Тернопільській області

Впродовж звітного тижня на території Тернопільської області спостерігалася прохолодна зимова погода, в окремі дні були опади у вигляді мокрого снігу з дощем.

Максимальна температура повітря вдень підвищувалася до +4...+8°C.

Мінімальна температура повітря вночі знижувалася до -4...-1°C.

Фенологія с/г культур

Озимі зернові – початок кущення;

Багаторічні трави – відростання.

Озимий ріпак – утворення розетки;

Фітосанітарний стан агроценозів

Фітосанітарним моніторингом посівів озимої пшениці (пл. 0,3 тис.га), озимого ріпаку (пл. 0,3 тис.га) та багаторічних трав (пл. 0,02 тис.га) виявлено, що чисельність **мишоподібних гризунів** становить:

- в посівах озимих зернових культур заселено 65% посівів, при середній чисельності 1,4 жилих колоній/га, максимальній 3,0 жилих колоній/га (2,0-4,0 жилих нір/колонію).
- в посівах озимого ріпаку заселено 65% посівів, при середній чисельності 1,5 жилих колоній/га, максимальній – 3,0 жилих колоній/га (3,0-5,0 жилих нір/колонію).
- в посівах багаторічних трав заселено 100% посівів, при середній чисельності 3,1 жилих колоній/га, максимальній – 5,0 жилих колоній/га (3,0-5,0 жилих нір/колонію).

В першій декаді грудня, буде продовжуватися заселення гризунами посівів озимих зернових, озимого ріпаку та багаторічних трав; проходитиме їх живлення сходами рослин, шкідливість зростатиме.