

31.12.2025

Оперативна інформація

про стан розвитку та розповсюдження основних шкідників і хвороб
сільськогосподарських рослин у Тернопільській області

Впродовж звітного тижня на території Тернопільської області спостерігалася типова зимова погода з морозами та снігопадами. В окремі дні відмічалися відлиги. Сформувався сталий сніговий покрив.

Максимальна температура повітря вдень підвищувалася до $-4...-2$ °С, під час відлиг — до $0...+1$ °С.

Мінімальна температура повітря вночі знижувалася до -11 °С.

Фенологія с/г культур

Озимі зернові – стан спокою;

Багаторічні трави – стан спокою.

Озимий ріпак – стан спокою;

Фітосанітарний стан агроценозів

Фітосанітарним моніторингом посівів озимої пшениці (пл. 0,15 тис.га) та озимого ріпаку (пл. 0,1 тис.га) виявлено, що чисельність **мишоподібних гризунів** становить:

- в посівах озимих зернових культур заселено 35% посівів, при середній чисельності 1,2 жилих колоній/га, максимальній 2,0 жилих колоній/га (2,0-3,0 жилих нір/колонію).
- в посівах озимого ріпаку заселено 40% посівів, при середній чисельності 1,3 жилих колоній/га, максимальній – 2,0 жилих колоній/га (2,0-3,0 жилих нір/колонію).