

13.04.2023

Інформаційне повідомлення

про стан розвитку та розповсюдження основних шкідників і хвороб
сільськогосподарських рослин у Тернопільській області

Впродовж звітного тижня на території Тернопільської області спостерігалася переважно хмарна погода, подекуди випадали опади у вигляді дощу та мокрого снігу.

Максимальна температура повітря вдень піднімалася до +14°C Мінімальна температура повітря вночі знижувалася до +1°C.

Фенологія с/г культур

Озимі зернові – кущення;
Озимий ріпак – ріст стебла;

Багаторічні трави - весняне відростання;
Яблуня – розпускання бруньок;
Груша – розпускання бруньок.

Фітосанітарний стан агроценозів

Дощова погода першої декади квітня стримала польові роботи, а також вихід шкідників.

В третій декаді квітня в умовах теплої погоди чисельність і шкідливість шкідників на посівах буде зростати.

Інформація
щодо поширення і чисельності шкідників сільськогосподарських рослин в Тернопільській області
станом на **13 квітня 2023 року**

№ п/п	Назва культури	Обстежено, тис.га	Назва шкідника	Заселено, %		Чисельність, екз.						Пошкоджено (сисними-заселено) рослин, бруньок, листків, суцвіть, плодів, %		Ступінь пошкодження, %		
				Площ	Рослин (дерев)	Одиниця виміру	Імаго	Яйце	Личинки		Ентомофаги	Середній	Максимальний	Слабкий	Середній	Сильний
									Екз.	вік						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Озима пшениця	1,2	Хлібна смугаста блішка	25	-	Екз/рослину	1,0		-			0,2	1,0	100	0	0
2.			Хлібна жужелиця	41	-	Екз/кв.м	3,0		0,4			0,3	1,0	100	0	0
3.			Злакові цикадки	21	-	Екз/10п.с.	3,0					0,2	1,0	100	0	0
4.			Шведська муха	19	-	Екз/кв.м			2,5			0,5	1,0	100	0	0
5.	Озимий ріпак	1,0	Стебловий ріпаковий прихованохоботник	13	0,3	Екз/рослину	0,3					0,3	2,0	100	0	0
6.			Стебловий капустяний прихованохоботник	2	-	Екз/рослину	4,0					0,3	1,0	100	0	0
7.			Ріпаковий квіткоїд	2	-	Екз/рослину	14,0					0,2	1,0	100	0	0
8.			Ріпаковий насінневий прихованохоботник	2	-	Екз/рослину	2,0					0,1	1,0	100	0	0

9.	Конюшина	0,01	Конюшинний насіннєд-апїон	1	-	Екз/ кв.м	0,2					0,3	1,0	100	0	0
10.			Булбочковий довгоносик	3	-	Екз/ кв.м	0,3					0,4	1,0	100	0	0
11.	Яблуня	0,02	Яблуневий квіткоїд	2	0,3	Екз/ дерево	1,0					0,3	1,0	100	0	0

Інформація

щодо ураження хворобами сільськогосподарських рослин в Тернопільській області
станом на **13 квітня 2023 року**

№ п/п	Назва культури	Обстежено, тис.га	Назва хвороби	У Р А Ж Е Н О, %						Розвиток хвороби, %	Загинуло рослин, %
				Площ	Рослин		Назва ураженого органу	Органів рослин			
					Середній	Максимальний		середній	максимальн.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Озима пшениця	1,2	Септоріоз	7	0,4	1,0	листя	0,3	1,0	0,3	-
2.			Борошниста роса	10	0,8	2,0	листя	0,4	2,0	0,5	-
3.			Кореневі гнилі	11	0,6	1,0	корінь	0,6	1,0	-	-
4.	Озимий ріпак	1,0	Пероноспороз	15	0,9	2,0	листя	0,6	2,0	0,5	-
5.			Бактеріоз коренів	7	0,6	1,0	корінь	0,6	1,0	-	-