

Термінове повідомлення №13
про появу та розвиток шкідників і хвороб сільськогосподарських культур

ШКІДНИКИ ТА ХВОРОБИ ОЗИМОГО РІПАКУ

В посівах озимого ріпаку відмічається живлення гусениць *підгризаючих совок*, пошкоджено 0,3-1,0% рослин.

Спостерігається наростання шкідливості в посівах озимого ріпаку псевдогусениць *ріпакового трача*, гусениць *ріпакового білана* і *капустяної совки*. Пошкоджених нараховується 0,3-3,0% рослин, при середній чисельності фітофагів 0,5-1,0 екз/кв.м.

Рекомендується при зростанні чисельності шкідників до ЕПШ (псевдогусениці ріпакового пильщика 3,0 екз/кв.м., гусениці капустяної совки та біланів – 2,0 екз/кв.м.) провести обприскування одним з інсектицидів, згідно Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні (зі змінами та доповненнями).

В ранніх посівах озимого ріпаку достатнє вологозабезпечення та прохолодна погода (+8-16°C) зумовило поширення та розвиток хвороб листя: *пероноспорозу* та *циліндроспоріозу*. Хворобами уражено 0,8-3,0% рослин, при поширенні хвороб на 8-15% обстежених площ.

Рекомендується при виявленні ознаках ураження хворобами необхідно терміново провести фунгіцидне обприскування посівів дозволеними до використання препаратами.

Прохолодна дощова погода сприятливо вплинула на ураження пізніх посівів озимого ріпаку (фаза сходів) *чорною ніжною*. Уражено ризоктоніозом 1,0-2,0% рослин на 5% обстежених площ ріпаку.

Рекомендується на пізніх посівах озимого ріпаку, для оздоровлення рослин, провести боронування.

Увага!!! При роботі з пестицидами необхідно суворо дотримуватись правил техніки безпеки та санітарно-гігієнічних вимог.