Термінове повідомлення №6
про появу та розвиток шкідників і хвороб сільськогосподарських культур

ШКІДНИКИ ТА ХВОРОБИ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР

В посівах озимої пшениці спостерігається зростання чисельності та шкідливості шкідників: пшеничного трипса, злакових попелиць та хлібних жуків на колосках.

Пшеничний трипс виявлений на 33% площ озимої пшениці, заселених рослин нараховується 5,0%, при середній чисельності личинок - 2,5 екз/рослину.

Заселення ***хлібними жуками*** (кузька) виявлено осередково на 13% обстежених площ оз/пшениці. Середня чисельність імаго шкідника складає 0,5 екз/кв.м.

Злакові попелиці заселили 2,3-7,0% колосків на 42% обстежених площ пшениці, при середній чисельності 3,1 екз/колос.

В наступній декаді чисельність та шкідливість фітофагів в посівах оз/пшениці зросте.

Рекомендується терміново обстежити посіви зернових культур при наближенні чисельності шкідників до ЕПШ: хлібних жуків – 3,0-5,0 екз/кв.м, злакової попелиці – 20-30 екз/колос, пшеничного трипса – 40-50 екз/колос, застосувати для регулювання чисельності інсектициди, згідно Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні (зі змінами та доповненнями).

Спостерігається наростання ураження посівів озимої пшениці ***бурою листковою іржею***. Хворобою охоплено 11% обстежених площ, в середньому уражених рослин нараховується 2,9%, максимально – 6,0%, з розвитком хвороби 1,3%. Продовжується ураження рослин озимої пшениці ***борошнистою росою*** (4,9-24,0% рослин), ***септоріозом*** (0,4-1,0%) та ***піренофорозом*** (4,0-12,0% рослин).

В першій декаді липня розвиток хвороб триватиме, ураження рослин зросте.

Погодні умови сприяли прояву та розвитку в посівах озимої пшениці ***фузаріозу колоса***. Хвороба поширена на 6,0% обстежених площ пшениці, уражених рослин нараховується 0,6-2,0%.

За умов підвищеної вологості повітря та температури повітря +22 +25ºС в період наливу зерна–початок дозрівання ураженість колосків хворобами колоса зростатиме.

Враховуючи, що утримується тепла волога погода, з частими дощами, **рекомендується** для запобігання ураження посівів озимої пшениці хворобами колоса (фузаріозу, септоріозу, альтернаріозу) провести захисні обробітки, застосувавши один з фунгіцидів, згідно Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні (зі змінами та доповненнями).

Увага!!! При роботі з пестицидами необхідно суворо дотримуватись регламентів застосування препаратів, правил техніки безпеки та санітарно-гігієнічних вимог.