


МЕТОДИ ВІЯВЛЕННЯ

Проведення обстежень:

- ▶ візуально та з використанням феромонних пасток



Призмкові пастки вивішують на сонячному боці, посередині крони, між гілками на висоті 5-8 м.



Липкі пастки (сині/фіолетові) дають найкращий результат) розміщують на спеціальних кілочках під деревами, або на стовбурах дерев

- ▶ з використанням ловильних дерев



СПОСОБИ ПОШИРЕННЯ

A. platanipis може поширюватись:

- ▶ самостійними перельотами (жуки можуть летіти на відстань 500 м - 1 км від кормового дерева);
- ▶ з сарджанцями ясеня (чи інших рослин-господарів);
- ▶ з деревиною та виробами з неї (в т.ч. з пакувальними матеріалами, круглою деревиною, гілками, дровами, трісками розміром понад 2,5 см);
- ▶ будь-якими транспортними засобами із зони масового розповсюдження (в період льоту жуки можуть випадково потрапляти на транспортні засоби і з їх допомогою переміщуватись на великі відстані).



Якщо ви підозрюєте, що знайшли ясеневу златку, повідомте про це звернувшись до Управління фітосанітарної безпеки Головного управління

Держпродспоживслужби в Тернопільській області

Тел. 0352 52-18-14

е-mail: fitobezreka@drps-te.gov.ua
46006, м. Тернопіль, вул. Чернівецька, 24



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ
ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ
ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ



ВУЗЬКОЗЛАТКА ЯСЕНЕВА СМАРАГДОВА

Agrilus platanipis Fair.

- опис комах;
- рослини-господарі;
- життєвий цикл;
- ознаки пошкодження;
- методи виявлення;
- способи поширення.



МІЖНАРОДНИЙ РІК ОХОРОНИ

ЗДОРОВ'Я РОСЛИН

2020



ОПИС КОМАХИ



Імаго або доросла особина:

7,5-14 мм завдовжки, 3,1-3,4 мм завширшки, тіло видовжене, клиновидне, смарагдово-зеленого кольору з бронзовим (ноді фіолетовим) блиском



Личинка: безнога, 26-32 мм

завдовжки, кремово-біла, тіло пласке, широке, складається з 10 сегментів, на останньому сегменті є пара зазублених стилетів



Лялечка: відкритого типу, 10-14 мм завдовжки, кремово-біла, антени тягнуться до основи надкрил; останні сегменти згинються донизу


РОСЛИНИ-ГОСПОДАРИ

A. planipennis пошкоджує всі види роду ясенів (*Fraxinus spp.*), при високій щільності популяції шкідника, може заселити також інші види дерев з родів горіха (*Juglans spp.*), липини (*Pterocarya spp.*), в'яза (*Ulmus spp.*)



**В Україні златку
вперше виявили на ясені
пенсільванському
(Fraxinus pennsylvanica)**

ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ



ОЗНАКИ ПОШКОДЖЕННЯ



- ▶ відростання водяних пагонів від стовбура;
- ▶ відмирання окремих гілок, або вихання всього дерева;



- ▶ звивисті ходи личинок златки під корою, у камбії («серпантиноподібні», «змелюподібні»)



- ▶ D-подібні вихідні отвори імаго (діаметр менше 1 см)