

Термінове повідомлення №1 про появу та розвиток шкідників і хвороб
сільськогосподарських культур

ШКІДНИКИ ТА ХВОРОБИ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР

Спостерігається живлення *злакових п'явиць* та *злакових попелиць* в посівах зернових культур, заселених та пошкоджених нараховується 1,1-3,0% рослин, при середній чисельності п'явиць – 0,6 екз/кв.м. та личинок попелиць – 0,5 екз/рослину. *Хлібною смугастою блішкою* пошкоджено 2,4-5,0% рослин ярого ячменю, з чисельністю 0,7 екз/кв.м.

Відмічено ураження ярого ячменю *гельмінтоспориозом*, хвороба поширилася на 16% обстежених площ, уражених рослин нараховується 0,5-2,0% рослин.

В посівах озимої пшениці спостерігається інтенсивне поширення *борошнистої роси*. Хворобою охоплено 29% площ, уражених нараховується 1,8-4,0% рослин.

Відмічається розвиток та поширення *піренофорозу* в посівах озимої пшениці, хвороба поширена на 7% площ, уражених нараховується 0,4-2,0% рослин.

В посівах озимої пшениці триває поширення *септоріозу* та *корневих гнилей*, уражених рослин нараховується відповідно 1,5-4,0% та 1,2-3,0% на 9% обстежених площ.

В наступних декадах за умов оптимальної температури повітря та достатнього зволоження, розвиток та поширення хвороб у посівах озимих та ярих зернових культур зросте.

Рекомендується задля запобігання масовому поширенню хвороб в посівах ярих зернових, провести захисні обприскування застосувавши один з дозволених фунгіцидів, відповідно до Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні (зі змінами та доповненнями).

Увага!!! При роботі з пестицидами необхідно суворо дотримуватись правил техніки безпеки та санітарно-гігієнічних вимог