

Термінове повідомлення №5 про появу та розвиток шкідників і хвороб сільськогосподарських культур

ШКІДНИКИ ТА ХВОРОБИ ГОРОХУ

Проходить заселення посівів гороху *гороховою попелицею, гороховою зернівкою та гороховим трипсом*. Горохова попелиця заселила 1,8% рослин на 25% площі, чисельність 2,0 екз/рослину. Горохова зернівка пошкодила 1,3-3,0% рослин також на 25% площі, чисельність 6,0 екз/10п.с., та гороховим трипсом пошкоджено 1,0-2,0% рослин на 3% площі, чисельність 3,0 екз/10п.с.

При теплій і сонячній погоді буде зростати активність та шкідливість шкідників на посівах гороху.

Рекомендується при перевищенні ЕПШ шкідників на посівах гороху, провести обприскування одним із дозволених до використання інсектицидів, згідно Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні (зі змінами та доповненнями).

Увага!!! Для уникнення отруєння бджіл інсектицидами, за 3-5 днів перед початком проведення хімічних обробок, необхідно попередити бджільників про захисні роботи.

В посівах гороху відмічається ураження *аскохітозом* 0,9-2,0% рослин на 13% площі, та *корневими гнилями* 1,0-2,0% рослин на 5% площі.

Рекомендується проводити постійний фітосанітарний моніторинг посівів і при виявленні ознак ураження рослин хворобами, провести фунгіцидне обприскування посівів одним з препаратів, згідно Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні (зі змінами та доповненнями).

Для підвищення ефективності обробітків, захисні обприскування необхідно комбінувати (при сумісності препаратів), застосовуючи бакові суміші препаратів (інсектицид + фунгіцид).

Слід зауважити, що оптимальним часом для проведення захисних робіт є період: з 6 по 9 ранку або з 7 по 9 вечора, в безвітряну суху погоду, при температурі повітря від +8°C до +25°C.

Увага!!! При роботі з пестицидами необхідно суворо дотримуватись регламентів застосування препаратів, правил техніки безпеки та санітарно-гігієнічних вимог.