

*Термінове повідомлення №6 про появу та розвиток шкідників і хвороб
сільськогосподарських культур*

ШКІДНИКИ ТА ХВОРОБИ СОНЯШНИКУ

На посівах соняшника відмічається заселення та пошкодження рослин личинками *геліхризової попелиці* та *листогризучих совок*. Геліхризовою попелицею заселено 1,9% рослин на 24% площі, при середній чисельності 3,0 екз/рослину. Листогризучими совками пошкоджено 0,5-1,0% рослин на 6% площі, при середній чисельності 0,3 екз/кв.м.

В першій декаді червня за умов сухої та теплої погоди чисельність шкідників зростає, також збільшиться їх шкідливість.

Рекомендується проводити постійний фітосанітарний моніторинг посівів соняшнику і при збільшенні заселеності рослин геліхризовою попелицею та листогризучими совками, провести обприскування одним з інсектицидів, згідно Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні (зі змінами та доповненнями).

В посівах соняшнику відмічається ураження 0,3-1,0% рослин *кореневими гнилями* на 4% площі.

В наступній декаді можливе збільшення ураженості рослин кореневими гнилями.

Рекомендується провести обстеження посівів соняшнику і при виявленні ураження рослин кореневими гнилями провести обробки фунгіцидами, згідно Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні (зі змінами та доповненнями).

Увага!!! При роботі з пестицидами необхідно суворо дотримуватись регламентів застосування препаратів, правил техніки безпеки та санітарно-гігієнічних вимог.