

ШКІДНИКИ ТА ХВОРОБИ ПЛОДОВИХ ДЕРЕВ

Проходить розмноження та заселення на яблуні *зеленої яблуневої попелиці, яблуневого пильщика та зеленої яблуневої плодожерки*. Зелена яблунева попелиця заселила 35% рослин на 68% площі, середня чисельність 8,0 екз/листок. Яблуневим пильщиком пошкоджено 0,8-2,0% рослин на 17% площі та зеленою яблуневою плодожеркою пошкоджено 0,2-1,0% рослин на 6% площі.

Тепла та волога погода в другій декаді червня сприятиме зростанню чисельності та шкідливості яблуневої попелиці.

Рекомендується при збільшенні чисельності шкідників застосувати інсектициди, згідно Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні (зі змінами та доповненнями).

Спостерігається ураження дерев яблуні *борошнистою росою та паршею*. Борошниста роса уразила 15,0-29,0% дерев на 68% площі. Паршею уражено 5,0-10,0% дерев на 20% площі.

Рекомендується проти борошнистої роси та парші провести обприскування дерева одним з фунгіцидів, згідно Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні (зі змінами та доповненнями).

Увага!!! При роботі з пестицидами необхідно суворо дотримуватись регламентів застосування препаратів, правил техніки безпеки та санітарно-гігієнічних вимог.