

*Термінове повідомлення №9 про появу та розвиток шкідників і хвороб
сільськогосподарських культур*

ШКІДНИКИ ТА ХВОРОБИ СОНЯШНИКУ

На посівах соняшника відмічається заселення та пошкодження рослин личинками *геліхризової попелиці*, *листогризучих* та *підгризаючих совок*. Геліхризовою попелицею заселено 3,3% рослин на 23% площі, при середній чисельності 6,0 екз/рослину. Листогризучими совками пошкоджено 2,0-3,0% рослин на 8% площі, при середній чисельності 0,8 екз/кв.м. Підгризаючими совками пошкоджено 1,0-2,0% рослин на 6% площі, чисельність 0,5 екз/кв.м.

При сприятливих погодних умовах, чисельність та шкідливість попелиць та совок зростатиме.

Рекомендується проводити постійний фітосанітарний моніторинг посівів соняшнику і при збільшенні заселеності рослин геліхризовою попелицею, листогризучими та підгризаючими совками, провести обприскування одним з інсектицидів, згідно Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні (зі змінами та доповненнями).

В посівах соняшнику відмічається ураження 1,9-4,0% рослин *пероноспорозом* на 6% площі.

За сприятливих погодних умов, розвиток хвороби триватиме, ураження рослин збільшуватиметься.

Рекомендується провести обстеження посівів соняшнику і при виявленні ураження рослин пероноспорозом провести обробки фунгіцидами, згідно Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні (зі змінами та доповненнями).

Увага!!! При роботі з пестицидами необхідно суворо дотримуватись регламентів застосування препаратів, правил техніки безпеки та санітарно-гігієнічних вимог.