

Термінове повідомлення №4
про появу та розвиток шкідників і хвороб сільськогосподарських культур

ШКІДНИКИ ТА ХВОРОБИ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ

Триває заселення та живлення жуків *бурякових блішок* і *бурякової крихітки* в посівах цукрових буряків. Шкідниками пошкоджено 0,8-2,0% рослин, при чисельності жуків 2,0-4,0 екз/кв.м.

Відмічено появу крилатих самок-засновниць популяції *бурякової листкової попелиці* на кущах-господарях. Спостерігається початок заселення даним фітофагом посівів цукрових буряків, заселених нараховується 1,0-2,0% рослин, при чисельності 3,0-4,0 екз/рослину.

Сіримі буряковими довгоносиками пошкоджено 1,0-2,0% рослин цукрових буряків, при чисельності 4,0 екз/кв.м.

За умов теплої та сухої погоди живлення фітофагів триватиме, пошкодженість рослин зросте.

Рекомендується проводити постійний моніторинг посівів цукрових буряків, а за умов сухої і жаркої погоди, при перевищенні ЕПШ бурякових блішок 3,0-7,0 екз/кв.м, заселенні 5,0% рослин або інших шкідників, необхідно провести захист посівів, із застосуванням препаратів: Актара 240 SC, к.с. 0,09 л/га, Бестселлер Турбо 200, КС 0,05-0,12 л/га, Борея, КС 0,1 л/га, Децис f-Люкс 25 ЕС, КЕ 0,25-0,5 л/га, Кайзо, ВГ 0,125-0,15 кг/га, Нурел Д, к.е. 0,8 л/га, Енжіо 247 SC, КС 0,18 л/га, Біммер к.е. 0,5-1,0 л/га, Коннект 112,5 SC, КС 0,5-0,6 л/га, Бі-58 новий, к.е. 0,5-1,0 л/га, Карате Зеон 050 CS, СК 0,125-0,15 л/га, Нокаут, КЕ 0,25 л/га, Протеус 110 OD, МД 1,0 л/га, Моспілан, ВП 0,075 кг/га, Актеллік 500 ЕС, КЕ 1,0-2,0 л/га, Суперкіл 440, КЕ 1,0 л/га, Золон 35, к.е. 3,0-3,5 л/га, або їх аналоги.

Увага!!! При роботі з пестицидами необхідно суворо дотримуватись правил техніки безпеки та санітарно-гігієнічних вимог.