

Термінове повідомлення №5
про появу та розвиток шкідників і хвороб сільськогосподарських культур

ШКІДНИКИ ТА ХВОРОБИ ЗЕРНОВИХ КОЛОСОВИХ КУЛЬТУР

Надмірне вологозабезпечення на фоні помірних температур повітря сприяли розвитку хвороб листя озимої пшениці. Даними хворобами охоплено 16-40% площ, уражених виявлено 1,3-7,0% рослин в слабкому ступені.

На окремих посівах озимої пшениці виявлено ознаки ураження рослин **піренофорозом** (*жовтою плямистістю*), уражених рослин нараховується 0,6-2,0% рослин в слабкому ступені.

Розвиток та поширення хвороб листя в посівах озимої площі продовжуватиметься, ураженість рослин зросте.

Рекомендується проводити систематичний моніторинг посівів озимих зернових культур і при виявленні ураження рослин: борошнистою росою – 1,0%, септоріозом або піренофорозом 3,0-5,0% рослин, провести фунгіцидні обробітки посівів одним з дозволених препаратів.

В посівах озимої пшениці з ураженням рослин піренофорозом, дієвими будуть препарати з двома-трьома діючими речовинами, яким при плануванні захисних міроприємств, слід надати перевагу: Аканто плюс 28, КС 0,5-0,75 л/га, Імпакт К, КС 0,6-0,8 л/га, Солігор 425 ЕС, КЕ. 0,7-0,9 л/га, Тілт Турбо 575 ЕС, КЕ 0,8-1,0 л/га, Імпера Голд, КЕ 0,8-1,2 л/га, Медісон 263 SC, КС 0,7-0,9 л/га, Віртуоз, КЕ 0,4-0,5 л/га, та ін.

В посівах ярого ячменю спостерігається живлення імаго **хлібної смугастої блішки**. Пошкоджених блішками нараховується 8,0-10,0% рослин, за чисельності 3,0-4,0 екз/кв.м.

Рекомендується при підвищенні чисельності до ЕПШ (хлібні блішки – 30-50 екз/кв.м.) в посівах ярих зернових, провести обробітки одним з дозволених до використання інсектицидів.

Погодні умови сприяли ураженню рослин ярого ячменю **сітчастим гельмінтоспоріозом**. Хвороба охопила 10% обстежених площ, уражених нараховується відповідно 1,2-2,0% рослин ячменю.

В окремих посівах ярого ячменю спостерігається ураження рослин **кореневими гнилями**. Хвороба поширена на 3% площ, уражено 0,3-1,0% рослин ярого ячменю.

Рекомендується для оздоровлення рослин і запобігання масовому поширенню хвороб в посівах ярих зернових культур, провести захисні обприскування із застосуванням одним з дозволених фунгіцидів: Авіатор Хрго 225 ЕС, КЕ 0,6-0,8 л/га, Амістар Екстра 280 SC, КС 0,5-0,75 л/га, Дерозал 500 SC, КС 0,5 л/га, Дазім 80, ВГ 0,3 кг/га, Топсін М-500, КС 1,2-1,4 л/га, Абакус мк.е. 1,25-1,75 л/га, Аканто плюс 28, КС 0,5-0,75 л/га, Тілт Турбо 575 ЕС, КЕ 0,8-1,0 л/га, Солігор 425 ЕС, КЕ 0,7-0,9 л/га, Аліот, КЕ 0,4-0,5 л/га, Колосаль Про, МЕ 0,3-0,4 л/га, Варенон 520, к.е. 0,6-1,0 л/га, Міраж, КЕ 1,0 л/га, Флуафол, КС 0,5 л/га, Рекс Дуо, КС 0,5 л/га, Містік Супер к.е. 1,0 л/га, Таліус 20, КЕ 0,15-0,25 л/га, Супрім, ЕВ 0,8-1,2 л/га, або їх аналогами.

Увага!!! При роботі з пестицидами необхідно суворо дотримуватись регламентів застосування препаратів, правил техніки безпеки та санітарно-гігієнічних вимог.