

**Термінове повідомлення №16**  
**про появу та розвиток шкідників і хвороб сільськогосподарських культур**

**ШКІДНИКИ ТА ХВОРОБИ СОЇ**

В посівах сої відмічено активне розмноження та розселення сисних шкідників: *тютюнового трипса* та *горохової попелиці*, якими заселено 4,9-9,0% рослин, при чисельності личинок 1,0-5,0 екз/рослину відповідно.

В посівах сої спостерігається відродження та живлення гусениць *листогризучих совок*, що пошкодили 1,0-4,0% рослин, при чисельності 0,3 екз/кв.м.

Відмічено заселення 12,0-16,0% рослин сої *навугтинними кліщами*, при чисельності 2,0 екз/лист та пошкодження 3,0-5,0% рослин трав'яними клопами, при чисельності 0,5 екз/кв.м.

**Рекомендується**, проводити систематичний моніторинг посівів сої в період формування бобів і при чисельності шкідників вище ЕПШ (тютюновий трипс – 10-15 екз/рослину, листогризучі совки – 1,0-3,0 екз/кв.м.), використати дозволені до використання інсектициди: Актеллік 500 ЕС, КЕ 1,2-2,0 л/га, Децис f-Люкс 25 ЕС, КЕ 0,25-0,3 л/га, Енвідор 240 SC, КС 0,4-0,5 л/га, Брейк, МЕ 0,07-0,1 л/га, Кораген 20, КС 0,15 л/га, Пірінекс Супер, КЕ 0,75-1,25 л/га, Сірокко, КЕ 0,8-1,2 л/га, Цезар, КЕ 0,2-0,3 л/га, Суперкіл 440, КЕ 0,5-0,75 л/га, Коннект 112,5 SC, КС 0,4-0,5 л/га, Борей, КС 0,14 л/га, Кемастраюрі 100 EW, EB 0,1-0,15 л/га, Золон 35, к.е.2,5 л/га або інші.

Заселення посівів сої сисними шкідниками призвело до прояву *жовтої мозаїки*. Вірусне захворювання виявлено на 3% обстежених площ, уражених нараховується 1,1-3,0% рослин.

В посівах сої відмічається розвиток та зростання поширення грибкових хвороб: *пероноспорозу*, *аскохітозу* та *септоріозу*, якими уражено 1,4-11,0% рослин.

В посівах сої відмічено ураження рослин *бактеріальним опіком*. Хворобою охоплено 2% обстежених площ, уражено 0,2-1,0% рослин.

За сприятливих погодних умов розвиток даних хвороб триватиме, ураженість рослин збільшиться.

**Рекомендується**, обстежити посіви сої, і при ураженні рослин провести обробітки фунгіцидами: Абакус, мк.е. 1,5 л/га, Косайд 2000, ВГ 1,5-2,5 л/га, Амістар Екстра 280 SC, КС 0,5-0,75 л/га, Імпера Голд, КЕ 0,8-1,5 л/га, Фитал, РК 2,5-3,0 л/га, Аканто Плюс 28, КС 0,75-1,0 л/га, Купроксат, КС 1,0-2,0 л/га, Мерпан, ВГ 2,0-2,5 кг/га, Піктор Актив, КС 0,7-1,0 л/га, Бампер Супер, КЕ 0,8-1,5 л/га, їх аналогами, або іншими препаратами. Обробітки при необхідності повторити.

**Наголошуємо!!!** Для запобігання розвитку резистентності, при повторних обробках, слід дотримуватись чергування пестицидів, тобто не застосовувати препарати з одними і тими діючими речовинами.

**Увага!!!** При роботі з пестицидами необхідно суворо дотримуватись регламентів застосування препаратів, правил техніки безпеки та санітарно-гігієнічних вимог.